



Prévention de la cécité

par les soins oculaires primaires

Lésion	Conduite à tenir
	Corps étranger <ol style="list-style-type: none"> 1 Enlever le corps étranger prudemment 2 Pommade antibiotique oculaire 3 Surveiller le lendemain l'état oculaire 4 Evacuer si extraction impossible
	Erosion cornéenne <ol style="list-style-type: none"> 1 Pommade antibiotique oculaire 3 fois par jour pendant 3 jours 2 Pansement stérile 3 Evacuer si état non amélioré après 3 jours
	Sang à l'intérieur de l'œil (Hyphéma) <ol style="list-style-type: none"> 1 Pansement occlusif bilatéral 2 Repos au lit 5 jours 3 Evacuer si l'hyphéma persiste après 3 jours
	Déchirure palpébrale (touchant le bord palpébral) <ol style="list-style-type: none"> 1 Rechercher d'autres blessures oculaires 2 Pansement stérile protecteur 3 Antibiotiques généraux 4 Evacuation
	Brûlures (chimiques ou thermiques) <ol style="list-style-type: none"> 1 Lavage immédiat et abondant de l'œil avec de l'eau propre 2 Pommade antibiotique oculaire 3 Evacuation urgente
	Perforation de l'œil <ol style="list-style-type: none"> 1 PAS de gouttes ou de pommades oculaires 2 Pansement protecteur 3 Seulement antibiotiques généraux 4 Evacuation urgente

Lésion	Conduite à tenir
	Conjonctivite avec sécrétions <ol style="list-style-type: none"> 1 Laver les yeux quotidiennement 2 Pommade antibiotique oculaire 3 fois par jour pendant 7 jours 3 Evacuer si absence d'amélioration après 3 jours
	Conjonctivite du nouveau-né <ol style="list-style-type: none"> 1 Enlever le pus par lavage toutes les heures 2 Pommade ou gouttes antibiotiques oculaires jusqu'à amélioration 3 Antibiotiques généraux 4 Evacuer enfant et parents à l'hôpital
	Ulcère cornéen <ol style="list-style-type: none"> 1 Pommade antibiotique oculaire toutes les heures 2 Antibiotiques généraux 3 Vitamine A (200.000 UI) chez les enfants 4 Evacuation urgente
	Avitaminose A cécitante <ol style="list-style-type: none"> 1 Vitamine A (capsule à 200.000 UI) immédiatement, le lendemain et après 2 semaines 2 Evacuation urgente
	Œil rouge douloureux avec perte de vision <ol style="list-style-type: none"> 1 Evacuation urgente

Lésion	Conduite à tenir
	Trachome <ol style="list-style-type: none"> 1 Laver le visage tous les jours 2 Pommade tétracycline à 1% tous les jours pendant 6 semaines ou azithromycine si disponible 3 Examiner tous les membres de la maison
	Trichiasis trachomateux <ol style="list-style-type: none"> 1 Pommade antibiotique oculaire tous les jours 2 Evacuer d'urgence pour opération
	Pterygion <ol style="list-style-type: none"> 1 Evacuer avant l'envahissement du centre de la cornée
	Avitaminose A <ol style="list-style-type: none"> 1 Vitamine A (capsules à 200.000 UI) immédiatement et tous les 6 mois 2 Apprendre aux parents à donner tous les jours à l'enfant des aliments riches en vitamine A
	Cataracte <ol style="list-style-type: none"> 1 Evacuer si le malade ne peut pas compter les doigts à 6 mètres ou moins

Evacuer à l'hôpital tous les patients avec une vision inférieure à 3/10

Ne jamais appliquer de corticostéroïdes oculaires sans prescription