



Estudio multipaís sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer



Hallazgos por país

Nueva Zelanda

1. Introducción

El Estudio multipaís sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2000 y 2003 recopiló información de más de 24 000 mujeres procedentes de Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, República Unida de Tanzania, Samoa, Serbia y Montenegro y Tailandia. Mediante un cuestionario elaborado y validado para utilizar en diversos entornos culturales, se evaluaron experiencias de mujeres en relación con la violencia, centrándose en particular en la violencia infligida por la pareja. También se investigó el modo en que dicha violencia está vinculada a la mala salud y a las lesiones, así como las estrategias que utilizan las mujeres para defenderse de la violencia.

En Nueva Zelanda, el personal de la Universidad de Auckland llevó a cabo un Estudio multipaís de la OMS de este tipo, con el apoyo de un Grupo Consultivo compuesto por representantes del Colectivo Nacional de Refugios Independientes para Mujeres, *Prevenir la violencia en el hogar*, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social, *A+ Health Promotion*, la Policía de Nueva Zelanda y el Instituto de Política Pública de la Universidad de Tecnología de Auckland. La financiación fue proporcionada únicamente por el Consejo de Investigación Sanitaria de Nueva Zelanda. Éste fue el estudio basado en la población más amplio que se ha realizado en Nueva Zelanda sobre esta cuestión. La recopilación de datos se llevó a cabo en 2003.

2. Métodos

En Nueva Zelanda, se entrevistó a un total de 1436 mujeres de edades entre los 18 y los 64 años en Auckland y 1419 en North Waikato. El 26% de las mujeres de Auckland habían cursado estudios universitarios, en contraposición a un 16% de las mujeres de North Waikato. Se consideró que las mujeres «habían tenido pareja alguna vez» si habían estado casadas alguna vez, habían vivido con un hombre o tenían actualmente pareja sexual estable.

En el estudio se utilizaron las siguientes definiciones de violencia: *violencia física* significaba que la mujer había sido abofeteada, le habían tirado algo que pudiera herirla; había sido empujada o le habían tirado del cabello; había sido golpeada con el puño o con otro objeto que pudiera herirla; había sido golpeada con el pie, arrastrada o había recibido una paliza; había sido estrangulada o quemada a propósito; o había sido amenazada o se había utilizado contra ella una pistola, cuchillo u otra arma. *Violencia sexual* significaba que la mujer había sido obligada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad; había mantenido relaciones sexuales porque tenía miedo de lo que pudiera hacer su pareja; o había sido obligada a realizar algún acto sexual que considerara degradante o humillante.

3. Principales hallazgos


Los resultados sobre la prevalencia de la violencia infligida por la pareja se presentan en relación con las mujeres de edades entre los 18 y los 49 años, para facilitar la comparabilidad entre los países. Todos los demás resultados hacen referencia a las mujeres de edades entre los 18 y los 64 años.

3.1 Prevalencia de la violencia infligida por la pareja

- El 30% de las mujeres de Auckland que habían tenido pareja alguna vez, y el 38% de las de North Waikato afirmaron haber sufrido violencia física a manos de su pareja en algún momento de su vida.
- El 14% de las mujeres de Auckland que habían tenido pareja alguna vez y el 22% de las de North Waikato afirmaron que habían sufrido violencia sexual a manos de su pareja en algún momento de su vida.
- Al combinar estos datos, el resultado es que el 34% de las mujeres de Auckland que habían tenido pareja alguna vez y el 42% de las de North Waikato habían sufrido violencia física y/o sexual a manos de su pareja en algún momento de su vida.



Porcentaje de mujeres que sufrieron violencia por la pareja, entre mujeres de 18 a 49 años de edad que alguna vez tuvieron pareja, Nueva Zelanda



3.2 Lesiones infligidas por la pareja

- El 48% de las mujeres de Auckland que habían sido sometidas a violencia física y/o sexual por sus parejas, y el 53% de las de North Waikato, habían sido lesionadas. Los tipos de lesiones iban de rasguños y cardenales, esguinces y luxaciones a daños en ojos y oídos, cortes, mordiscos y fracturas. En Auckland, el 24% de las mujeres que habían sufrido lesiones necesitaron atención sanitaria debido a la gravedad de éstas. En North Waikato, este porcentaje era del 30%.

3.3 Violencia física y sexual infligida a partir de los 15 años por personas que no son la pareja

- El 15% de las entrevistadas de Auckland y el 17% de las de North Waikato habían sufrido violencia física a manos de una persona que no era su pareja desde los 15 años. En la mayoría de los casos, las mujeres mencionaban a su padre como el autor de la violencia.
- El 9% de las mujeres de Auckland y el 12% de las de North Waikato habían sufrido violencia sexual a manos de una persona que no era su pareja desde los 15 años. En la mayoría de casos se afirmaba que dichos actos fueron cometidos por extraños.

3.4 Efectos de la violencia infligida por la pareja en la salud de la mujer

- El 7% de las mujeres que habían sufrido violencia física y/o sexual en Auckland calificaban su salud como mala, en comparación con el 3% de las mujeres que nunca habían sufrido malos tratos; en North Waikato, estos porcentajes eran del 7% y del 2%, respectivamente.
- El 42% de las mujeres de Auckland que habían sufrido violencia física y/o sexual, y el 52% de las de North Waikato, habían pensado en alguna ocasión en suicidarse, en comparación con el 17% en Auckland, y el 19% en North Waikato, de las mujeres que no habían sufrido violencia.
- El hecho de haber sufrido violencia a manos de la pareja a lo largo de la vida se asociaba en muchos casos con diversos efectos actuales (en las últimas cuatro semanas) en la salud, entre ellos problemas con las actividades de la vida cotidiana y otros indicadores de salud física.
- En comparación con las mujeres que no habían sufrido violencia física a manos de su pareja, era mucho más probable que las mujeres que habían sufrido violencia física a manos de su pareja hubieran visitado a un dispensador de asistencia de salud en las cuatro semanas anteriores.
- Se observó un efecto «dosis-respuesta», ya que las mujeres que afirmaban haber sufrido actos graves de violencia física a manos de su pareja presentaban un mayor riesgo de tener mala salud actualmente que las mujeres que habían sufrido actos de violencia física moderada a manos de su pareja. Sin embargo, incluso el grupo que afirmaba haber sufrido violencia física «moderada» presentaba un riesgo notablemente elevado de problemas de salud, en comparación con las mujeres que no habían sufrido violencia física a manos de su pareja.

3.5 Búsqueda de ayuda por las mujeres maltratadas físicamente por su pareja

- El 27% de las mujeres de Auckland que habían sufrido violencia física y/o sexual, y el 22% de las de North Waikato, nunca habían revelado a nadie su experiencia. En caso de que la hubieran revelado a alguien, estas personas eran amigos o familiares.
- Sólo el 32% de las mujeres de Auckland que habían sufrido violencia física y/o sexual, y el 29% de las de North Waikato, habían pedido ayuda a un servicio oficial (servicios de salud, policía, dirigentes religiosos o locales, etc.).
- Las mujeres que pedían ayuda lo hacían porque no podían soportar más tiempo la situación (el 56% de las mujeres de Auckland que pedían ayuda y el 45% de las de North Waikato), o porque habían sufrido lesiones graves (el 18% en Auckland y el 15% en North Waikato).

Para mayor información, visite

<http://www.who.int/gender/violence/en/>

o póngase en contacto con:

Janet Fanslow, PhD
Social and Community Health,
School of Population Health,
University of Auckland,
Private Bag 92019,
Auckland, New Zealand
Tel.: +64 9 373 7599 ext. 86907
Fax: +64 9 303 5932

Departamento de Género y
Salud de la Mujer,
Organización Mundial de la Salud,
Avenue Appia 20,
1211 Ginebra 27,
Suiza.
Fax: +41 22 791 1585.
Correo electrónico:
genderandhealth@who.int