



Estudio multipaís sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer



Hallazgos por país

Samoa

1. Introducción

El Estudio multipaís sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2000 y 2003 recopiló información de más de 24 000 mujeres procedentes de Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República Unida de Tanzania. Mediante un cuestionario elaborado y validado para ser utilizado en diversos entornos culturales, se evaluaron experiencias de mujeres en relación con la violencia, centrándose en particular en la violencia infligida por la pareja. También se investigó el modo en que dicha violencia está vinculada a la mala salud y a las lesiones, así como las estrategias que utilizan las mujeres para defenderse de la violencia.

En Samoa, el Estudio fue realizado en el marco del Estudio multicéntrico del Pacífico sobre los efectos de la violencia contra la mujer en la salud y la seguridad familiar; una iniciativa de investigación conjunta de la secretaría de la Comunicad del Pacífico y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La investigación fue llevada a cabo con la asistencia del Ministerio Samoano de Asuntos de la Mujer y los datos se recopilaron en el año 2000.

2. Métodos

En Samoa, se entrevistó a una muestra representativa de todo el país de 1 640 mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años. En Samoa, se consideró que las mujeres "habían tenido pareja alguna vez" si habían estado casadas alguna vez o habían vivido con un hombre. Casi las tres cuartas partes de ellas habían estado casadas o habían vivido con un hombre, de las cuales el 72% estaban casadas cuando se realizaron las entrevistas. El 82% de las mujeres había llegado a recibir enseñanza secundaria.

En el estudio se utilizaron las siguientes definiciones de violencia infligida por la pareja: *violencia física* significaba que la mujer había sido abofeteada, le habían tirado algo que pudiera herirla; había sido empujada; golpeada con el puño u otra cosa que pudiera herirla; había sido golpeada con el pie, arrastrada o recibido una paliza; estrangulada o quemada a propósito; y amenazada o se había utilizado contra ella una pistola, cuchillo u otra arma. *Violencia sexual* significaba que la mujer había sido obligada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad; había mantenido relaciones sexuales porque tenía miedo de lo que pudiera hacer su pareja; y había sido obligada a realizar algún acto sexual que considerara degradante o humillante.

3. Principales hallazgos

3.1 Prevalencia de la violencia infligida por la pareja


- El 41% de las mujeres que habían tenido pareja alguna vez había sido objeto de actos de violencia física de parte de su pareja y el 20% había sufrido violencia sexual a lo largo de su vida.
- Entre las mujeres que habían tenido pareja alguna vez, la prevalencia combinada de violencia física y sexual infligida por la pareja era del 54% en el grupo de las que habían recibido enseñanza primaria, del 45% en el de las que había recibido enseñanza secundaria y del 35% en el de las que habían recibido enseñanza universitaria. Era menos común que se hubieran cometido actos de violencia contra mujeres que vivían en zonas urbanas o tenían niveles de ingresos más elevados.

3.2 Lesiones infligidas por la pareja

- El 30% de las mujeres que habían sido víctimas de actos de violencia física cometidos por sus parejas informó haber sido lesionada, y casi la mitad de estas mujeres lo había sido en al menos tres ocasiones.
- Las lesiones más comunes mencionadas fueron rasguños y moretones (en el 74% de las mujeres que habían sido heridas), daños en ojos y oídos (30%) y cortes, pinchazos y mordiscos (29%).



Porcentaje de mujeres que sufrieron violencia por la pareja, entre mujeres de 15 a 49 años de edad que alguna vez tuvieron pareja, Samoa



3.3 Violencia física de la pareja durante el embarazo

- El 10% de las entrevistadas que habían estado embarazadas alguna vez había sido golpeada durante al menos un embarazo.
- Entre las mujeres que habían estado embarazadas alguna vez y habían sufrido maltratos físicos, el 24% había sido golpeada durante el embarazo.
- En más del 96% de los casos, el autor había sido el padre del hijo que llevaba la mujer.

3.4 Violencia física y sexual infligida a partir de los 15 años por personas que no son la pareja

- En general, el 65% de las entrevistadas manifestó haber sido víctima, desde los 15 años, de actos de violencia cometidos por una persona distinta de su pareja. El 62% de las mujeres había sido maltratada físicamente y el 11% afirmó haber sufrido abusos sexuales.
- Los principales autores de actos de violencia eran mujeres de la familia (63% de todas las entrevistadas), el padre (58%) y enseñantes (30%). Los autores de abusos sexuales mencionados con mayor frecuencia eran los novios (46%) y extraños (24%).

3.5 Abuso sexual cometido contra niñas menores de 15 años y primera relación sexual forzada

- En las entrevistas cara a cara, el 2% de las mujeres informaron haber sufrido abusos sexuales antes de los 15 años.
- El 8% de las mujeres que habían tenido alguna vez relaciones sexuales afirmó que su primera experiencia sexual había sido forzada. Entre las que habían tenido su primera relación sexual antes de los 15 años, el índice se elevó al 35%.

Para mayor información, visite

<http://www.who.int/gender/violence/en/>

o póngase en contacto con:

Secretaría de la Comunidad del Pacífico,
BP D5, 98848 Noumea Cedex,
Nueva Caledonia.
Tel.: +687 26 2000
Correo electrónico:
spc@spc.int

Departamento de Género y Salud de la Mujer,
Organización Mundial de la Salud,
Avenue Appia 20,
1211 Ginebra 27,
Suiza.
Fax: +41 22 791 1585.
Correo electrónico:
genderandhealth@who.int

© Organización Mundial de la Salud 2005

3.6 Efectos de la violencia infligida por la pareja en la salud de la mujer

- La probabilidad de que las mujeres maltratadas física o sexualmente afirmaran sufrir dolores (29%) era significativamente mayor que la de las mujeres que nunca habían sido maltratadas (22%); y era mayor la probabilidad de que afirmaran sufrir mareos (55% frente al 44%) y flujos vaginales (4% frente al 2%).
- Las mujeres que habían sido víctimas de actos de violencia de la pareja consideraban con mayor frecuencia la posibilidad del suicidio (15% frente al 8%).
- Entre las mujeres que habían estado embarazadas alguna vez, las maltratadas tenían una probabilidad considerablemente mayor de haber dado a luz un mortinato (16% frente al 10%) y de haber tenido abortos espontáneos (15% frente al 8%).

3.7 Búsqueda de ayuda de las mujeres maltratadas físicamente por sus parejas

- El 54% de las mujeres que habían sufrido maltratos físicos, en particular en zonas rurales, no había revelado su experiencia a nadie, mientras que el 25% se la había confiado a sus padres, el 12% a amigas o amigos, el 7% a hermanos y el 5% a vecinas o vecinos. Menos del 2% había acudido a personal médico o a la policía.
- El 85% de las mujeres que habían sido maltratadas físicamente por sus parejas nunca había pedido ayuda a un organismo oficial. Entre las que sí lo habían hecho, la policía y los centros médicos fueron los más mencionados.
- Las principales razones por las que dijeron haber pedido ayuda eran las siguientes: no podían soportar más la violencia (el 65% de las que pidieron ayuda), habían sido gravemente heridas (27%), sus parejas habían amenazado con matarlas (7%) o sus hijos estaban sufriendo (7%).
- El 86% de las mujeres maltratadas físicamente que no habían pedido ayuda explicaron que no lo habían hecho porque pensaban que el maltrato era "normal", o no lo suficientemente grave para buscar ayuda.