



Estudio multipaís sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer



Serbia y Montenegro

1. Introducción

El Estudio multipaís sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2000 y 2003 recopiló información de más de 24 000 mujeres procedentes de Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República Unida de Tanzania. Mediante un cuestionario elaborado y validado para ser utilizado en diversos entornos culturales, se evaluaron experiencias de mujeres en relación con la violencia, centrándose en particular en la violencia infligida por la pareja. También se investigó el modo en que dicha violencia está vinculada a la mala salud y a las lesiones, así como las estrategias que utilizan las mujeres para defenderse de la violencia.

En Serbia y Montenegro el Estudio fue realizado por el *Autonomous Women's Center*, una organización feminista no gubernamental con más de diez años de experiencia en la violencia doméstica, y por *Strategic Marketing*, una empresa profesional sobre encuestas. El comité consultivo del Estudio estuvo formado por representantes del Ministerio de Sanidad de la República de Serbia, la Asamblea de la ciudad de Belgrado y del Departamento de Sanidad y por la Escuela de Medicina de la Universidad de Belgrado. El Estudio fue financiado por Trocaire, Irlanda, y la recopilación de datos fue llevada a cabo en el año 2003.

2. Métodos

En el Estudio llevado a cabo en Serbia y Montenegro se entrevistó a 1456 mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años en la capital de Serbia, Belgrado. El 91% de las mujeres entrevistadas "habían tenido pareja alguna vez" (definido como haber estado casada alguna vez, haber vivido con un hombre o tener una pareja sexual estable en la actualidad), de las que a su vez el 90% tenía una relación al realizar la entrevista. Mientras que el 51% de las mujeres habían cursado estudios superiores, el 46% sólo había finalizado sus estudios secundarios.

En el estudio se utilizaron las siguientes definiciones de violencia infligida por la pareja: *violencia física* significaba que la mujer había sido abofeteada, le habían tirado algo que pudiera herirla; había sido empujada o le habían tirado del cabello; había sido golpeada con el puño u otra cosa que pudiera herirla; golpeada con el pie, arrastrada o recibido una paliza; estrangulada o quemada a propósito; y amenazada o se había utilizado contra ella una pistola, cuchillo u otra arma. *Violencia sexual* significaba que la mujer había sido obligada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad; había mantenido relaciones sexuales porque tenía miedo de lo que pudiera hacer su pareja; y había sido obligada a realizar algún acto sexual que considerara degradante o humillante.

3. Principales hallazgos

3.1 Prevalencia de la violencia infligida por la pareja


- El 23% de las mujeres que habían tenido pareja alguna vez afirmó haber sufrido violencia física y el 6% violencia sexual de parte de su pareja. Si combinamos estos datos, el 24% de las mujeres había sido objeto de actos de violencia física o sexual y el 4% lo había sido durante los últimos doce meses.
- La violencia había sido una tercera parte más frecuente entre las mujeres que habían recibido enseñanza primaria solamente (33%) y secundaria (28%) que entre las licenciadas en la universidad (20%).

3.2 Lesiones infligidas por la pareja

- El 30% de las mujeres que habían sufrido violencia física en manos de sus parejas manifestaron haber sido lesionadas (el 36% lo había sido en el último año). Entre las formas más comunes de lesiones mencionadas destacan los rasguños y moretones (en el 85% de las mujeres lesionadas), los cortes, pinchazos y mordiscos (19%) y las fracturas (12%).



Porcentaje de mujeres que sufrieron violencia por la pareja, entre mujeres de 15 a 49 años de edad que alguna vez tuvieron pareja, Belgrado, Serbia y Montenegro



3.3 Violencia física de la pareja durante el embarazo

- El 3% de las mujeres entrevistadas que habían estado embarazadas alguna vez había sido golpeada por su pareja durante un embarazo. De ellas, el 45% había sido golpeada con el pie o el puño en el abdomen.
- El 48% de estas mujeres también había sido golpeada antes de quedar embarazada, lo que implica que en más de la mitad de los casos la violencia física había comenzado durante el embarazo.

3.4 Violencia física y sexual infligida a partir de los 15 años por personas que no son la pareja

- El 10% de las entrevistadas indicaron que alguna persona distinta de su pareja había cometido actos de violencia física contra ellas desde que tenían 15 años. Los autores más frecuentes eran el padre (36%), mujeres de la familia (22%), novios (20%) o extraños (19%).
- El 4% de las entrevistadas afirmaron haber sido objeto de actos de violencia sexual de parte de alguien que no era su pareja. Los autores más frecuentes eran extraños (43%) y novios (32%).

3.5 Abuso sexual cometido contra niñas menores de 15 años y primera relación sexual forzada

- El 4% de las mujeres indicó haber sufrido abuso sexual antes de los 15 años. Los autores más frecuentes eran extraños (mencionados por el 39% de las que informaron de dichos abusos) y hombres de la familia (21%).
- Menos del 1% de las mujeres que habían tenido alguna vez relaciones sexuales afirmó que su primera experiencia sexual había sido forzada.

Para mayor información, visite

<http://www.who.int/gender/violence/en/>

o póngase en contacto con:

Stanislava Otasevic,
Autonomous Women's Center,
Tirsova 5a 11000,
Belgrado,
Serbia
Tel./Fax: +381 11243 5455
Correo electrónico:
zdrawc@eunet.yu

Departamento de Género y
Salud de la Mujer,
Organización Mundial de la Salud,
Avenue Appia 20,
1211 Ginebra 27,
Suiza.
Fax: +41 22 791 1585.
Correo electrónico:
genderandhealth@who.int

© Organización Mundial
de la Salud 2005

3.6 Efectos de la violencia infligida por la pareja en la salud de la mujer

- El 9% de las mujeres que habían sido objeto de actos de violencia física o sexual calificaron su salud general de mala o muy mala en comparación con el 4% de las mujeres que nunca habían sido maltratadas.
- Las mujeres que habían estado embarazadas alguna vez y habían sido objeto de actos de violencia de su pareja tuvieron más abortos provocados (65% frente al 46%) y tenían más posibilidades de que hubiera muerto un hijo suyo (5% frente al 2%).
- El 22% de las mujeres que habían sufrido actos de violencia de sus parejas habían pensado alguna vez en suicidarse, en comparación con el 7% de las que no habían sido objeto de actos de violencia.

3.7 Búsqueda de ayuda de las mujeres maltratadas físicamente por sus parejas

- El 27% de las mujeres maltratadas físicamente no comunicó a nadie su experiencia de violencia, mientras que el 53% se la confiaron a amigos, el 28% a sus padres y el 26% a hermanos. Muchas menos acudieron a la policía (5%), a personal de salud (4%) o a otro servicio oficial o autoridad.
- El 78% de las mujeres que habían sido maltratadas físicamente nunca pidió ayuda a un organismo oficial. Sólo el 12% acudió a la policía y el 10% a un servicio médico. Entre el 6% y el 9% pidió ayuda a un servicio social o jurídico o a un tribunal, pero ninguna afirmó haber ido a un refugio.
- Los principales motivos citados para buscar ayuda fueron que no podían soportar la violencia por más tiempo (mencionado por el 63% de las mujeres que buscaron ayuda), habían sido heridas de gravedad (30%) o que sus hijos estaban sufriendo (12%). Algunas de ellas buscaron ayuda cuando sus parejas amenazaron con matarlas (8%) o amenazaron o pegaron a sus hijos (5%).
- Las dos terceras partes de las mujeres maltratadas físicamente no buscaron ayuda porque pensaban que el maltrato era "normal" o no lo suficientemente grave como para buscar ayuda.