



Estudio multipaís sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer



Hallazgos por país

Tailandia

1. Introducción

El Estudio multipaís sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2000 y 2003 recopiló información de más de 24.000 mujeres procedentes de Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República Unida de Tanzania. Mediante un cuestionario elaborado y validado para ser utilizado en diversos entornos culturales, se evaluaron experiencias de mujeres en relación con la violencia, centrándose en particular en la violencia infligida por la pareja. También se investigó el modo en que dicha violencia está vinculada a la mala salud y a las lesiones, así como las estrategias que utilizan las mujeres para defenderse de la violencia.

En Tailandia, el Estudio fue realizado conjuntamente por el Instituto de Población y Estudios Sociales de la Universidad de Mahidol y la Fundación para Mujeres. Se trató de la primera encuesta de población llevada a cabo en Tailandia sobre este tema y la recopilación de datos tuvo lugar en el año 2000.

2. Métodos

En Tailandia, se entrevistó a 1536 mujeres en Bangkok con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años y a 1282 en Nakhonsawan. Los niveles educativos fueron considerablemente más elevados en Bangkok, donde el 65% de las mujeres habían superado la educación primaria, en comparación con el 37% de Nakhonsawan. En Tailandia, se consideró que las mujeres "habían tenido pareja alguna vez" si habían estado casadas alguna vez, habían vivido con un hombre o tenían una pareja sexual estable en la actualidad.

En el estudio se utilizaron las siguientes definiciones de violencia infligida por la pareja: *violencia física* significaba que la mujer había sido abofeteada, le habían tirado algo que pudiera herirla; había sido empujada; había sido golpeada con el puño u otra cosa que pudiera herirla; había sido golpeada con el pie, arrastrada o recibido una paliza; estrangulada o quemada a propósito; y había sido amenazada o se había utilizado contra ella una pistola, cuchillo u otra arma. *Violencia sexual* significaba que la mujer había sido obligada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad; había mantenido relaciones sexuales porque tenía miedo de lo que pudiera hacer su pareja; y había sido obligada a realizar algún acto sexual que considerara degradante o humillante.

3. Principales hallazgos

3.1 Prevalencia de la violencia infligida por la pareja


- Entre las mujeres que habían tenido pareja alguna vez, el 23% en Bangkok y el 34% en Nakhonsawan informaron haber sido objeto de actos de violencia física de parte de la propia pareja en algún momento de sus vidas.
- El 30% en Bangkok y el 29% en Nakhonsawan afirmaron haber sido objeto de actos de violación sexual de parte de sus parejas.
- Combinando estos datos, entre las mujeres que habían tenido pareja alguna vez, el 41% en Bangkok y el 47% en Nakhonsawan habían sido objeto de actos de violencia física o sexual de parte de sus parejas.

3.2 Lesiones infligidas por la pareja

- Entre las mujeres que habían sufrido violencia física a manos de sus parejas, el 51% en Bangkok y el 44% en Nakhonsawan habían sido lesionadas alguna vez. Las lesiones variaron de rasguños y moretones, esguinces y dislocaciones, daños en oídos y ojos, cortes, pinchazos o mordiscos a fracturas. En Bangkok, el 31% de las mujeres lesionadas lo habían estado de tanta gravedad que habían necesitado asistencia médica. En Nakhonsawan, este porcentaje fue del 23%.



Porcentaje de mujeres que sufrieron violencia por la pareja, entre mujeres de 15 a 49 años de edad que alguna vez tuvieron pareja, Tailandia



3.3 Violencia física de la pareja durante el embarazo

- El 4% de las mujeres tanto de Bangkok como de Nakhonsawan que habían estado embarazadas alguna vez habían sufrido maltratos físicos durante un embarazo. Cerca de un tercio de ellas afirmaron que habían sido golpeadas con el puño o el pie en el abdomen durante el embarazo. En casi todos los casos, el autor había sido el padre del hijo que llevaba la mujer.

3.4 Violencia física y sexual infligida a partir de los 15 años por personas que no son la pareja

- El 8% de las entrevistadas en Bangkok y el 10% en Nakhonsawan habían sufrido maltratos físicos desde los 15 años a manos de una persona distinta de su pareja. Los autores más mencionados fueron los familiares.
- El 6% de las mujeres de Bangkok y el 3% de Nakhonsawan habían sufrido abusos sexuales desde la edad de los 15 años por una persona distinta de su pareja.
- En Bangkok, los autores más citados fueron los extraños, mencionados por el 45% de las mujeres que habían sido objeto de actos de violencia sexual. En cambio en Nakhonsawan los novios fueron los que más se citaron (por el 21% de las mujeres que habían sufrido abusos sexuales).

3.5 Abuso sexuales cometido contra niñas menores de 15 años y primera relación sexual forzada

- El 9% de las entrevistadas en Bangkok y el 5% en Nakhonsawan afirmaron haber sufrido abusos sexuales antes de los 15 años. Los principales autores habían sido extraños, mencionados por el 58% en Bangkok, y el 30% en Nakhonsawan.
- Entre las mujeres que habían tenido relaciones sexuales alguna vez, el 4% en Bangkok y el 5% en Nakhonsawan mencionaron que su primera experiencia sexual había sido forzada.

3.6 Efectos de la violencia infligida por la pareja en la salud de la mujer

- El 20% de las mujeres que habían sido maltratadas física o sexualmente en Bangkok calificaron su salud general como mala, en comparación con el 13% de las mujeres que no habían sido maltratadas; en Nakhonsawan estos índices fueron del 27% y 18%, respectivamente.
- El 38% de las mujeres de Bangkok que habían sufrido maltratos físicos o sexuales y el 33% de Nakhonsawan habían pensado alguna vez en suicidarse frente al 16% de las mujeres de ambos lugares que no habían sido maltratadas.

3.7 Búsqueda de ayuda de las mujeres maltratadas físicamente por sus parejas

- El 37% de las mujeres de Bangkok que habían sido maltratadas físicamente y el 46% de Nakhonsawan no le habían contado a nadie su experiencia violenta. En los casos en los que se lo habían dicho a alguien, normalmente era a sus padres o a su familia política.
- Sólo el 20% de las mujeres de Bangkok que habían sufrido maltratos físicos y el 10% de Nakhonsawan acudieron alguna vez a servicios formales (salud, policía, líderes religiosos o locales, etc.) en busca de ayuda.
- Las mujeres que buscaron ayuda lo hicieron porque no podían soportar la situación por más tiempo (44% de las mujeres de Bangkok que habían buscado ayuda y el 31% de Nakhonsawan), o porque habían sido heridas de gravedad (31% en Bangkok y el 26% en Nakhonsawan).

Para mayor información, visite

<http://www.who.int/gender/violence/en/>

o póngase en contacto con:

Dr. Churnrurtai Kanchanachitra,
Director,
Institute for Population
and Social Research,
Mahidol University,
Salaya,
Nakhon Pathom 73170,
Tailandia.
Tel.: +66 02-441-0202 ext. 212,
Fax: +66 02-441-9333
Correo electrónico:
directpr@mahidol.ac.th

Departamento de Género y
Salud de la Mujer,
Organización Mundial de la Salud,
Avenue Appia 20,
1211 Ginebra 27,
Suiza.
Fax: (41) 22 791 1585.
Correo electrónico:
genderandhealth@who.int

© Organización Mundial
de la Salud 2005