

FICHE D'INFORMATION :
PROGRÈS DANS LES PAYS À REVENU FAIBLE OU INTERMÉDIAIRE PAR RÉGION

VERS UN ACCÈS UNIVERSEL


Étendre les interventions prioritaires liées au VIH/SIDA dans le secteur de la santé

SEPTEMBRE 2009 **RAPPORT DE SITUATION**

L'accès au traitement antirétroviral continue de s'étendre rapidement. Fin 2008, plus de 4 millions d'habitants de pays à revenu faible ou intermédiaire prenaient des médicaments antirétroviraux, alors qu'ils n'étaient que près de 3 millions en 2007. Les progrès les plus marqués ont été enregistrés en Afrique subsaharienne, où se produisent les deux tiers des infections par le VIH dans le monde.

Afrique subsaharienne

- On estime que 2,9 millions de patients suivaient un traitement antirétroviral en Afrique subsaharienne en 2008, contre près de 2,1 millions en 2007, soit une augmentation de 39%.
- La couverture du traitement antirétroviral dans la région atteignait 44% en 2008, alors qu'elle était de 33% en 2007. Néanmoins, les écarts dans la couverture entre régions se creusent : l'accès était plus large en Afrique orientale et australe (48%) qu'en Afrique centrale et de l'Ouest (30%).
- Dans la région, près de 45% des femmes enceintes séropositives ont reçu des médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant ; elles étaient 35% en 2007.
- De 2007 à 2008, le nombre estimé d'enfants d'Afrique subsaharienne qui suivaient un traitement antirétroviral est passé de 158 000 à 225 000. La couverture totale du traitement antirétroviral chez les enfants dans la région s'établit à près de 35%.



Amérique latine et Caraïbes

- Quelque 445 000 patients suivaient un traitement antirétroviral en Amérique latine et aux Caraïbes en 2008, contre 390 000 en 2007, soit une augmentation régionale de 14%.



- La couverture du traitement antirétroviral dans la région était de 54% en 2008, comparée à 50% en 2007.
- En Amérique latine, le pourcentage de femmes enceintes séropositives qui ont reçu des médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH a grimpé de 47% à 54% entre 2007 et 2008. Le pourcentage correspondant aux Caraïbes était de 52%, contre 29% l'année précédente.
- Environ 16 100 enfants suivaient un traitement antirétroviral en Amérique latine et aux Caraïbes, alors qu'ils étaient 14 700 en 2007. Dans cette région, fin 2008, 76% des enfants pour qui un traitement était indiqué en bénéficiaient.

Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est

- Quelque 565 000 patients bénéficiaient d'un traitement antirétroviral dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la région, contre 420 000 en 2007, ce qui correspond à une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente et une multiplication par huit depuis 2003.
- La couverture du traitement antirétroviral dans la région était de 37% en 2008, alors qu'elle atteignait 29% en 2007.
- Près de 25% des femmes enceintes séropositives dans la région avaient accès aux médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH en 2008, contre 24% en 2007.
- En 2008, 30 000 enfants séropositifs suivaient un traitement, tandis qu'ils étaient 20 800 en 2007. Cela représente un taux de couverture du traitement antirétroviral de près de 52%.

Europe et Asie centrale

- En 2008, 85 000 personnes suivaient un traitement antirétroviral en Europe et Asie centrale, contre 54 000 en 2007, soit une augmentation de 57%.
- La couverture du traitement antirétroviral dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la région était de 23% en 2008 ; en 2007, elle atteignait 16%.
- On estime que dans cette région, 94% des femmes enceintes séropositives recevaient des médicaments pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH, une progression par rapport au taux de 74% enregistré en 2007.
- Le nombre d'enfants sous traitement antirétroviral est passé de 3000 en 2007 à 4200, ce qui représente environ 85% des enfants qui en ont besoin.

Afrique du Nord et Moyen-Orient

- Quelque 10 000 personnes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient avaient accès au traitement antirétroviral en 2008. Elles étaient 7000 en 2007, soit une augmentation de 43%.
- La couverture du traitement antirétroviral dans la région demeure faible : à peine 14% des personnes ayant besoin d'antirétroviraux en 2008 ont eu accès à ces médicaments (11% en 2007).
- En 2008, 1% des femmes enceintes séropositives ont reçu des médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH.
- De 2007 à 2008, le nombre estimé d'enfants dans la région qui suivaient un traitement antirétroviral est passé de 180 à près de 400. Cela représente un taux de couverture régionale du traitement antirétroviral de 6% seulement.