

# Liste par pays<sup>1</sup>

## Vaccination contre la fièvre jaune – prescriptions et recommandations ; et situation du paludisme

### Introduction

Les informations données pour chaque pays comprennent les exigences officielles en matière de vaccination contre la fièvre jaune, les recommandations de l’OMS aux voyageurs concernant la vaccination contre la fièvre jaune et des précisions sur la situation du paludisme et les mesures de prévention recommandées.<sup>2,3</sup>

### Fièvre jaune

Le risque de transmission de la fièvre jaune dépend de la présence du virus dans le pays chez l’homme, le moustique ou d’autres animaux. L’OMS détermine les zones où « il existe un risque de transmission de la fièvre jaune » d’après les critères suivants : la fièvre jaune y est ou y a été signalée et il existe des vecteurs et des réservoirs animaux.

### Vaccination contre la fièvre jaune

La vaccination anti-amarile est pratiquée dans un double but :

1. Pour éviter la propagation internationale de la maladie *en protégeant les pays* contre le risque d’importation ou de propagation du virus de la fièvre jaune. Dans ce cas, les pays concernés exigent la vaccination.

Les pays qui exigent une preuve de vaccination<sup>2</sup> sont ceux où la maladie peut sévir ou non et où le moustique vecteur et les primates non humains hôtes poten-

---

<sup>1</sup> Dans la présente publication, le terme « pays » désigne les pays, territoires et zones.

<sup>2</sup> On notera que la vaccination exigée des enfants de plus de 6 mois par certains pays est contraire aux conseils de l’OMS (voir le chapitre 6). Les voyageurs doivent toutefois savoir qu’elle conditionne l’entrée dans les pays concernés.

<sup>3</sup> L’OMS publie ces prescriptions à titre d’information seulement ; la présente publication ne constitue pas une approbation desdites prescriptions ni une confirmation qu’elles sont conformes aux dispositions du Règlement sanitaire international.

tiels du virus de la fièvre jaune sont présents. Par conséquent, toute importation du virus par un voyageur contaminé peut entraîner à la fois sa propagation et son installation et un risque d'infection permanent pour la population humaine. Une preuve de vaccination est souvent exigée des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune (parfois même des voyageurs qui n'ont fait qu'y transiter). Certains pays exigent une preuve de vaccination de tous les voyageurs. La période de validité du certificat international de vaccination contre la fièvre jaune est de 10 ans à compter du dixième jour qui suit la vaccination. Les pays qui exigent la vaccination anti-amarile pour entrer sur leur territoire imposent cette condition en vertu du Règlement sanitaire international. Les conditions exigées par les pays peuvent changer à tout moment. On trouvera les toutes dernières informations sur le site [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith). La liste par pays présentée ici a été établie d'après les renseignements fournis par les pays sur les prescriptions en matière de vaccination anti-amarile.

Les voyageurs en possession d'un certificat d'exemption de vaccination anti-amarile signé par un médecin autorisé ou un agent de santé agréé peuvent néanmoins être autorisés à entrer sur le territoire mais être mis sous quarantaine pendant un maximum de 6 jours à compter de la date de la dernière exposition possible à l'infection, être placés sous surveillance ou être tenus de signaler une fièvre ou d'autres symptômes à l'autorité compétente. Ces voyageurs doivent recevoir des informations sur les moyens de se protéger contre les vecteurs de la fièvre jaune.

2. *Pour protéger les voyageurs* qui risquent d'être exposés à l'infection amarile.

Comme la fièvre jaune est souvent fatale pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées, la vaccination est recommandée à tous les voyageurs (à quelques exceptions près – voir le chapitre 6) qui se rendent dans des zones où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune. Il convient d'évaluer le risque individuel d'après la durée du voyage, les activités prévues, le risque d'exposition, les antécédents médicaux, l'âge et le statut vaccinal.

**Le fait qu'un pays n'exige pas la vaccination ne signifie pas qu'il n'y a aucun risque de transmission de la fièvre jaune.**

On trouvera à l'annexe 1 une liste récapitulative des pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune dans l'ensemble ou dans certaines parties de leur territoire ainsi qu'une liste des pays qui exigent une preuve de vaccination anti-amarile pour entrer sur leur territoire.

## Autres maladies

*Choléra.* Aucun pays ne déclare exiger de certificat de vaccination contre le choléra comme condition d'entrée. On trouvera au chapitre 6 des informations sur la vaccination anticholérique de circonstance.

*Variole.* Depuis que l'éradication mondiale de la variole a été certifiée en 1980, l'OMS ne recommande plus la vaccination antivariolique aux voyageurs.

*Autres maladies infectieuses.* On trouvera au chapitre 5 des informations sur les principales maladies infectieuses qui menacent les voyageurs, sur leur répartition géographique et les précautions qui s'imposent. Le chapitre 6 renseigne sur les maladies à prévention vaccinale.

## Paludisme

Des informations générales sur le paludisme et sa répartition géographique ainsi que des précisions sur les mesures préventives sont données au chapitre 7. Les mesures de protection contre les piqûres de moustiques sont décrites au chapitre 3. On trouvera dans la présente section des informations détaillées pour chaque pays et, pour tous les pays où il existe des zones impaludées, des indications épidémiologiques (distribution géographique et saisonnière, altitude, espèce prédominante, résistance), ainsi que les mesures de prévention recommandées. Les mesures préventives recommandées pour chaque pays sont déterminées sur la base des facteurs suivants : le risque de contracter le paludisme, les espèces de parasite rencontrées dans la zone, l'importance et la propagation de la pharmacorésistance signalée dans le pays, et le risque éventuel d'effets secondaires graves résultant de l'utilisation des différents médicaments à titre prophylactique. Dans les endroits où sévit le paludisme à *Plasmodium falciparum* et à *P. vivax*, la prévention du paludisme à *P. falciparum* est prioritaire. Sauf si le risque de paludisme est dû « exclusivement » à une espèce en particulier (*P. falciparum* ou *P. vivax*), les voyageurs peuvent être exposés à n'importe quelle espèce du parasite, y compris à des infections mixtes.

Les chiffres I, II, III et IV correspondent aux différents types de prévention indiqués dans le tableau ci-après.

	Risque de paludisme	Type de prévention
<b>Type I</b>	Risque très limité de transmission du paludisme	Prévention des piqûres de moustiques seulement
<b>Type II</b>	Risque de paludisme à <i>P. vivax</i> seulement; ou paludisme à <i>P. falciparum</i> parfaitement sensible à la chloroquine	Prévention des piqûres de moustiques et chimioprophylaxie par la chloroquine
<b>Type III<sup>a</sup></b>	Risque de transmission du paludisme à <i>P. vivax</i> et à <i>P. falciparum</i> , conjugué à l'émergence d'une résistance à la chloroquine	Prévention des piqûres de moustiques et chimioprophylaxie par l'association chloroquine-proguanil
<b>Type IV</b>	(1) Risque élevé de paludisme à <i>P. falciparum</i> , conjugué à une pharmacorésistance constatée; ou (2) Risque modéré à faible de paludisme à <i>P. falciparum</i> , conjugué à une pharmacorésistance importante constatée <sup>b</sup>	Prévention des piqûres de moustiques et chimioprophylaxie au choix: association atovaquone-proguanil, doxycycline ou méfloquine (choisir le médicament selon le type de pharmacorésistance constatée)

<sup>a</sup> Les pays où la prévention de type III reste pertinente se limitent à certaines parties de la Colombie et de l'Inde, au Népal, à Sri Lanka et au Tadjikistan. Au besoin, on peut lui substituer la prévention de type IV.

<sup>b</sup> Les personnes qui se rendent dans des zones rurales où sévit une forme de paludisme polypharmacorésistante et où le risque d'infection à *P. falciparum* est très faible peuvent associer un traitement de réserve d'urgence à la prévention des piqûres de moustiques.

## AÇORES voir PORTUGAL

### AFGHANISTAN

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû à *P. falciparum* et à *P. vivax* – existe de mai à fin novembre au-dessous de 2000 m. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

## AFRIQUE DU SUD

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans les zones de basse altitude de la province de Mpumalanga (y compris le parc national Kruger), de la province du Nord et du nord-est du KwaZulu-Natal jusqu'à la rivière Tugela, dans le sud. Le risque est le plus grand d'octobre à mai. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

**ALBANIE****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**ALGÉRIE****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme :** le risque de paludisme est limité. De petits foyers de transmission locale (*P. vivax*) ont été signalés dans les 6 wilayas du sud et du sud-est (Adrar, El Oued, Ghardaïa, Illizi, Ouargla, Tamanrasset), avec transmission locale isolée de *P. falciparum* dans les 2 wilayas les plus méridionaux, dans les zones de migration à travers le Sahara. Trois cas d'acquisition locale ont été signalés en 2008.

Prévention recommandée dans les zones à risque : I

**ALLEMAGNE****Fièvre jaune**

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

**ANDORRE****Fièvre jaune**

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

**ANGOLA****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée : oui

**Paludisme :** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : IV

**ANGUILLA****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**ANTIGUA-ET-BARBUDA****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**ANTILLES NÉERLANDAISES (BONAIRE, CURAÇAO, SABA, ST-EUSTACHE, ST-MARTIN)****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus de 6 mois en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**ARABIE SAOUDITE****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme :** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans la plus grande partie de la région du sud-ouest (sauf dans les zones de haute altitude de la province d'Asir). Il n'y a aucun risque à La Mecque et à Médine. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque : IV

**ARGENTINE****Fièvre jaune**

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : oui. La vaccination antiamarile est recommandée à

tous les voyageurs âgés d'au moins 9 mois qui se rendent dans les zones forestières du nord et du nord-est de l'Argentine, y compris les chutes d'Iguaçu et toutes les zones qui bordent le Brésil et le Paraguay. Ces zones comprennent tous les départements des provinces de Misiones et de Formosa; le département de Bermejo dans la province de Chaco; les départements de Berón de Astrada, Capital, General Alvear, General Paz, Ituzaingó, Itatí, Paso de los Libres, San Cosme, San Miguel, San Martín et Santo Tomé dans la province de Corrientes; les départements de Valle Grande, Ledesma, Santa Bárbara et San Pedro dans la province de Jujuy; et les départements de General José de San Martín, Oran, Rivadavia et Anta dans la province de Salta.

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – est très faible et limité aux zones rurales le long des frontières avec la Bolivie (plaines de la province de Salta) et avec le Paraguay (plaines des provinces du Chaco et de Misiones).

Prévention recommandée dans les zones à risque: II

#### ARMÉNIE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – est localisé de juin à fin octobre dans certains villages de la vallée d'Ararat, surtout dans le district de Masis. Il n'y a aucun risque dans les zones touristiques. Aucun cas autochtone signalé depuis 2006.

Prévention recommandée dans les zones à risque: I

#### AUSTRALIE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an arrivant en Australie dans les 6 jours suivant un séjour d'au moins une journée et une nuit dans un pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune, à l'exception des îles Galapagos en Équateur et seulement dans la province de Misiones en Argentine.

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### AUTRICHE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### AZERBAÏDJAN

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – est limité de juin à fin octobre dans les plaines, principalement dans la zone située entre les rivières Koura et Araxe.

Prévention recommandée dans les zones à risque: II

#### BAHAMAS

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** la transmission locale sporadique de *P. falciparum* a été signalée ces dernières années sur l'île de Great Exuma seulement, suite à l'importation internationale de parasites. Il n'y a aucun risque sur les autres îles.

Prévention recommandée à Great Exuma: I

#### BAHREÏN

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### BANGLADESH

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme existe toute l'année dans tout le pays, sauf à Dhaka. Il est le

plus élevé dans la division de Chittagong, dans les districts de Mymensingh, Netrakona et Sherpur dans la division de Dhaka, et dans le district de Kurigram dans la division de Rajshashi. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

#### BARBADE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### BÉLARUS

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### BELGIQUE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### BELIZE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. vivax* – existe dans tous les districts mais varie au sein des régions. Le risque est le plus grand dans les districts de Toledo et Stan Creek; modéré à Cayo; et faible dans les districts de Belize, Corozal et Orange Walk. On ne signale pas de souches de *P. falciparum* résistantes.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II**

#### BÉNIN

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

#### BERMUDES

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### BHOUTAN

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme existe toute l'année dans la zone sud qui englobe cinq districts: Chhukha, Samchi, Samdrup Jongkhar, Geylegphug et Shemgang. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

#### BIRMANIE voir MYANMAR

#### BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui, aux voyageurs se rendant dans des régions à risque telles que les départements de Beni, Cochabamba et Santa Cruz, et la partie subtropicale de la province de La Paz. Cela ne concerne pas les villes de La Paz et Sucre.

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. vivax* (91%) – existe toute l'année dans tout le pays au-dessous de 2500 m. Le paludisme à *P. falciparum* est présent à Santa Cruz et dans les départements septentrionaux de Beni et Pando, surtout dans les localités de

Cobja, Guayamerín et Ribalta. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II**; à Beni, Pando et Santa Cruz: **IV**

### BOSNIE-HERZÉGOVINE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### BOTSWANA

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune ou ayant traversé ces pays.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe de novembre à mai/juin dans les zones septentrionales du pays: districts/sous-districts de Boteti, Chobe, Ngamiland, Okavango, Tutume. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

### BRÉSIL

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: oui – aux voyageurs âgés de plus de 9 mois qui se rendent dans les zones où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune, y compris l'intégralité des États d'Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (y compris la capitale, Brasília), Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima et Tocantins, et les zones désignées des États suivants: nord-ouest et ouest de Bahia, centre et ouest de Paraná, sud-ouest de Piauí, nord-ouest et centre-ouest de Rio Grande do Sul, extrême-ouest de Santa Catarina, nord et ouest de São Paulo. La vaccination est recommandée aux voyageurs se rendant aux chutes d'Iguaçu. Elle n'est pas recommandée aux voyageurs se rendant dans les villes côtières suivantes: Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo.

**Paludisme:** dans les États situés hors de la « région amazonienne légale », le risque de transmission du paludisme est négligeable ou nul. Le risque de paludisme à *P. vivax* (84%), à *P. falciparum* (15%) et d'infections mixtes (1%) est présent dans la plupart des zones forestières au-dessous de 900 m dans les neuf États de la « région amazonienne légale » (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão (partie occidentale), Mato Grosso (partie septentrionale), Pará (sauf la ville de Belém), Rondônia, Roraima et Tocantins (partie occidentale)). L'intensité de la transmission varie d'une municipalité à l'autre, mais elle est plus élevée dans la jungle, notamment dans les zones de production minière et de colonisation rurale créées depuis moins de 5 ans, ainsi que dans certaines zones urbaines situées à la périphérie de Cruzeiro do Sul, Manaus et Pôrto Velho. Le paludisme sévit aussi à la périphérie de grandes villes comme Boa Vista, Macapá, Marabá, Rio Branco et Santarém. Polypharmacorésistance de *P. falciparum* signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

### BRUNEI DARUSSALAM

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune ou ayant traversé au cours des 6 jours précédents des zones qui présentent, en partie ou en totalité, un risque de transmission de la maladie.

Vaccination antiamarile recommandée: non

### BULGARIE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### BURKINA FASO

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans

tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

#### BURUNDI

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiarabique recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

#### CAÏMANES, ÎLES

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiarabique recommandée: non

#### CAMBODGE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiarabique recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays, sauf à Phnom-Penh et aux alentours de Tonle Sap. Risque négligeable dans la zone touristique d'Angkor Vat. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée. Résistance à la méfloquine et tolérance de l'artésunate signalées dans les provinces du sud-ouest.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

#### CAMEROUN

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiarabique recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans

tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

#### CANADA

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiarabique recommandée: non

#### CANARIES, ÎLES voir ESPAGNE

#### CAP-VERT

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiarabique recommandée: non

**Paludisme:** un risque limité de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe d'août à fin novembre dans l'île de São Tiago, où 16 cas d'acquisition locale ont été signalés en 2008.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **I**

#### CHILI

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiarabique recommandée: non

#### CHINE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiarabique recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – y compris à *P. falciparum* – existe dans les provinces de Hainan et Yunnan. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée. Risque limité de paludisme à *P. vivax* dans les provinces du sud et dans quelques provinces du centre, notamment Anhui, Ghuizhou, Henan, Hubei et Jiangsu. Il n'y a pas de risque de paludisme dans les zones urbaines.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II**; dans le Hainan et le Yunnan: **IV**

**CHINE, RAS DE HONG KONG****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**CHINE, RAS DE MACAO****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**CHRISTMAS, ÎLE**

(océan Indien)

**Fièvre jaune**

Mêmes exigences que pour l'Australie.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**CHYPRE****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**COLOMBIE****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: oui, aux voyageurs qui se rendent dans les zones suivantes, considérées comme présentant un risque de fièvre jaune: moyenne vallée du río Magdalena, contreforts est et ouest de la Cordillère orientale, de la frontière équatorienne à celle du Venezuela, Chocó et Antioqueño, Urabá, contreforts de la Sierra Nevada de Santa Narta, plaines orientales (Orinoquia et Amazonia).

**Paludisme:** le risque de paludisme – à *P. vivax* (72%) et à *P. falciparum* (27%) – est élevé toute l'année en milieu rural et dans les zones de jungle au-dessous de 1600 m, en particulier dans les municipalités des régions d'Amazonia, Orinoquia, Pacífico et Urabá-Bajo Cauca. L'intensité de la transmission varie d'un département à l'autre, le risque étant le plus élevé dans ceux d'Amazonas, Antioquia, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Putumayo et Vichada. On signale des souches de *P. falciparum* résistantes à la chloroquine dans les régions d'Amazonia, Pacífico et Urabá-Bajo Cauca. Résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **III**; dans les régions d'Amazonia, Pacífico et Urabá-Bajo Cauca: **IV**

**COMORES****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV****CONGO****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV****COOK, ÎLES****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**CORÉE, RÉPUBLIQUE DE, voir  
RÉPUBLIQUE DE CORÉE****CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE  
DÉMOCRATIQUE DE, voir RÉPUBLIQUE  
POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE****COSTA RICA****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune. Aucun certificat n'est exigé pour les voyageurs de moins de 9 mois et de plus de 60 ans, les femmes enceintes ou allaitantes, les sujets immunodéprimés, souffrant d'une infection à VIH asymptomatique, d'un trouble du thymus

ou ayant un antécédent de réactions indésirables associées au vaccin antiamaril ou d'allergie aux œufs ou à la gélatine.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû presque exclusivement à *P. vivax* – existe toute l'année dans la province de Limón, principalement dans le canton de Matina. Le risque est négligeable ou nul dans les autres cantons du pays.

Prévention recommandée dans les zones à risque : II

### CÔTE D'IVOIRE

#### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée : oui

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : IV

### CROATIE

#### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

### CUBA

#### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

### DANEMARK

#### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

### DJIBOUTI

#### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : IV

### DOMINIQUE

#### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

### ÉGYPTE

#### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune. Les pays et zones suivants sont considérés comme présentant un risque de transmission de la fièvre jaune.

Afrique : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan (au sud du 15° degré de latitude Nord), Tchad, Togo, Zambie.

Amériques : Belize, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guyana, Guyane française, Panama, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, Venezuela.

Les passagers aériens en transit venant de ces pays ou zones sans être munis d'un certificat seront gardés dans l'enceinte de l'aéroport jusqu'à ce qu'ils continuent leur voyage.

Tous les voyageurs venant du Soudan doivent être munis soit d'un certificat de vaccination, soit d'un certificat de résidence délivré par un bureau officiel soudanais et attestant qu'au cours des 6 jours précédents ils ne sont pas allés dans la partie du Soudan située au sud du 15° degré de latitude Nord.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : un risque très limité de paludisme à *P. falciparum* et à *P. vivax* peut exister de juin à

fin octobre dans le gouvernorat du Fayoum (aucun cas autochtone signalé depuis 1998).

Prévention recommandée: aucune

### EL SALVADOR

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** un très faible risque de paludisme – dû presque exclusivement à *P. vivax* – existe dans les zones rurales à forte immigration en provenance du Guatemala. Des cas sporadiques de paludisme à *P. vivax* sont signalés dans d'autres parties du pays.

Prévention recommandée dans les zones à risque: I

### ÉMIRATS ARABES UNIS

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### ÉQUATEUR

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune. Un certificat de vaccination est exigé des ressortissants et des résidents de l'Équateur se rendant dans une zone où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui, aux voyageurs qui se rendent dans les provinces du bassin amazonien (Morona, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos et Zamora) et dans d'autres zones de la partie orientale des Andes. Il n'y a pas de risque de transmission de la fièvre jaune dans les villes de Guayaquil et Quito ni sur les îles Galapagos.

**Paludisme:** le risque de paludisme – à *P. vivax* (92%) et à *P. falciparum* (8%) – existe toute l'année au-dessous de 1500 m, le risque de transmission étant modéré dans les provinces côtières. Il n'y a aucun risque à Guayaquil, à Quito et dans les autres villes de la région inter-andine. Résis-

tance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: IV

### ÉRYTHRÉE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – à *P. falciparum* et à *P. vivax* – existe toute l'année dans tout le pays au-dessous de 2200 m. Il n'y a aucun risque à Asmara. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: IV

### ESPAGNE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### ESTONIE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### ÉTHIOPIE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – à *P. falciparum* (60% environ) et à *P. vivax* (40%) – existe toute l'année dans tout le pays au-dessous de 2000 m. Résistance de *P. falciparum* à la chloro-

quine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée. Il n'y a aucun risque à Addis-Abeba.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

#### EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### FALKLANDS (MALVINAS), ÎLES

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### FÉDÉRATION DE RUSSIE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme**: un risque très limité de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – peut exister dans les zones de forte immigration en provenance des pays du sud de la Communauté des États indépendants.

Prévention recommandée: **aucune**

#### FÉROÉ, ÎLES

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### FIDJI

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### FINLANDE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### FRANCE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### GABON

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme**: le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

#### GALAPAGOS, ÎLES voir ÉQUATEUR

#### GAMBIE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme**: le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

#### GÉORGIE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme**: le risque de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – est focalisé de juillet à octobre dans la partie sud-est du pays.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **I**

#### GHANA

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus de 9 mois.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

#### GIBRALTAR

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### GRÈCE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### GRENADE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### GROENLAND

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### GUADELOUPE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### GUAM

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### GUATEMALA

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés

de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. vivax* – existe toute l'année au-dessous de 1500 m. Il est modéré dans les départements d'Escuintla et d'Izabal, et faible à Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Petén, Quiché (Ixcan) et Suchitepéquez.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II**

#### GUINÉE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

#### GUINÉE-BISSAU

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

#### GUINÉE ÉQUATORIALE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans

tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

## GUYANA

### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune, à l'exception de l'Argentine, du Paraguay et de la Trinité-et-Tobago. Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est également requis des voyageurs en provenance du Belize.

Vaccination anti-amarilienne recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – à *P. vivax* (51%), à *P. falciparum* (45%) et infections mixtes (4%) – est élevé toute l'année dans l'ensemble de l'arrière-pays. Il est le plus élevé dans les régions 1, 7, 8, 9 et 10; modéré dans les régions 2 et 3; et très faible dans les régions 4, 5 et 6. Des cas sporadiques de paludisme ont été signalés dans la région côtière densément peuplée. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

## GUYANE FRANÇAISE

### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination anti-amarilienne recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – à *P. falciparum* (45%) et à *P. vivax* (55%) – est élevé toute l'année dans neuf municipalités du territoire bornant le Brésil (vallée de l'Oyapock) et le Suriname (vallée du Maroni). Dans les 13 autres municipalités, le risque de transmission est faible ou négligeable. Polypharmacorésistance de *P. falciparum* signalée dans les zones de forte immigration en provenance du Brésil.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

## HAÏTI

### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en

provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination anti-amarilienne recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû exclusivement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. On ne signale pas de résistance de *P. falciparum* à la chloroquine.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II, IV**

## HONDURAS

### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune, à l'exception du Panama, pour lequel elle est recommandée seulement.

Vaccination anti-amarilienne recommandée: non

**Paludisme:** risque de paludisme à *P. vivax* (93%) et à *P. falciparum* (7%). Le risque de transmission de *P. vivax* est élevé dans le département de Gracias a Dios et modéré dans ceux d'Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Olancho, Valle et Yoro. Le risque de transmission de *P. falciparum* est élevé à Colón et Gracias a Dios, et modéré à Atlántida et Olancho.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II**

## HONG KONG (RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE CHINE) voir CHINE, RAS DE HONG KONG

## HONGRIE

### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination anti-amarilienne recommandée: non

## INDE

### Fièvre jaune

Condition exigée: toute personne (à l'exception des enfants de moins de 6 mois) arrivant par voie aérienne ou maritime sans être munie d'un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est isolée

pendant 6 jours au maximum i) si elle a quitté une zone où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune moins de 6 jours avant son arrivée, ii) si elle est passée en transit dans une telle zone (sauf, sous réserve de l'accord du médecin de l'aéroport, les passagers et membres de l'équipage qui, pendant toute la durée de leur transit dans un aéroport situé dans une zone où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune, sont demeurés dans les bâtiments de l'aéroport), iii) si elle arrive sur un navire ayant quitté ou touché un port situé dans une zone où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune moins de 30 jours avant son arrivée en Inde, sauf si ce navire a été désinsectisé conformément à la procédure établie par l'OMS, ou iv) si elle arrive dans un avion qui, s'étant trouvé dans une zone où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune, n'a pas été désinsectisé conformément aux dispositions de la Réglementation de l'Inde pour la Navigation aérienne (Santé publique) de 1954, ou aux dispositions recommandées par l'OMS. Les pays et zones suivants sont considérés comme présentant un risque de transmission de la fièvre jaune :

Afrique: Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Zambie.

Amériques: Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyana, Guyane française, Panama, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, Venezuela.

*Note:* Lorsqu'un cas de fièvre jaune est signalé dans un pays autre que ceux mentionnés ci-dessus, ce pays est considéré par le Gouvernement de l'Inde comme présentant un risque de transmission de la fièvre jaune et il est ajouté à cette liste.

Vaccination anti-amarilic recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme existe toute l'année dans tout le pays au-dessous de 2000 m, avec au total 40 % à 50 % des cas dus à *P. falciparum*, les autres étant dus à *P. vivax*. Il n'y a aucune transmission dans certaines parties des États de Himachal Pradesh, Jammu-et-Cachemire, et Sikkim. Le risque de paludisme à *P. falciparum* et de pharmacorésistance est relativement plus grand dans les États du nord-

est, sur les îles d'Andaman et de Nicobar, dans les États du Bengale occidentale (à l'exception de la ville de Calcutta), de Chhattisgarh, du Gujarat, du Jharkhand, du Karnataka (à l'exception de la ville de Bangalore), de Madhya Pradesh, de Maharashtra (à l'exception des villes de Mumbai, Nagpur, Nasik et Pune) et d'Orissa. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **III**; dans les zones à haut risque énumérées: **IV**

## INDONÉSIE

### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus de 9 mois en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination anti-amarilic recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme existe toute l'année dans toutes les zones des cinq provinces orientales des Moluques, des Moluques du nord, du Nusa Tenggara oriental, de la Papouasie et de la Papouasie occidentale. Dans les autres parties du pays, il y a un risque de paludisme dans certains districts, sauf dans la municipalité de Jakarta, les grandes villes et les principales stations touristiques. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée. Résistance de *P. vivax* à la chloroquine signalée. Infection humaine à *P. knowlesi* signalée dans la province du Kalimantan.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

## IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')

### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination anti-amarilic recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme à *P. vivax* et à *P. falciparum* existe de mars à fin novembre dans les zones rurales des provinces de l'Hormozgan, du Kerman (zone tropicale) et dans la partie méridionale du Sistan-Baluchistan. Résistance de

*P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

#### IRAQ

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** un risque limité de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – existe de mai à fin novembre dans des régions du nord au-dessous de 1500 m (provinces de Duhok, Erbil et Sulaimaniya).

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II**

#### IRLANDE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### ISLANDE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### ISRAËL

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### ITALIE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### JAMAÏQUE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** un risque très limité de paludisme à *P. falciparum* peut exister dans la paroisse de Kingston St Andrew.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **I**

#### JAPON

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### JORDANIE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### KAZAKHSTAN

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### KENYA

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui, pour tous les voyageurs à partir de 9 mois. Le risque de transmission est plus faible dans les villes de Mombasa et de Nairobi que dans les zones rurales.

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Il y a normalement peu de risque dans la ville de Nairobi et sur les hauts plateaux (au-dessus de 2500 m) des provinces suivantes:

Centrale, Nyanza, Occidentale, Orientale et Vallée du Rift. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

#### KIRGHIZISTAN

##### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – existe de juin à fin octobre dans certaines parties méridionales et occidentales du pays, principalement aux frontières de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan – régions de Batken, Jalal-Abad et Osh – et à la périphérie de Bishkek.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **I**

#### KIRIBATI

##### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

#### KOWEÏT

##### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

#### LESOTHO

##### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus de 9 mois en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

#### LETTONIE

##### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

#### LIBAN

##### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés

de plus de 6 mois en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

#### LIBÉRIA

##### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée : oui

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

#### LIECHTENSTEIN

##### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

#### LITUANIE

##### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

#### LUXEMBOURG

##### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

#### MACAO (RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE CHINE) voir CHINE, RAS DE MACAO

#### MADAGASCAR

##### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays, les zones côtières étant les plus exposées. Résistance à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

**MADÈRE, ÎLES voir PORTUGAL****MALAWI****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination anti-amarilic recommandée : non

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

**MALAISIE****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination anti-amarilic recommandée : non

**Paludisme** : le risque de paludisme n'existe que dans des foyers limités au fond de l'arrière-pays. Les zones urbaines et côtières sont exemptes de paludisme. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée. Infection humaine à *P. knowlesi* signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **IV**

**MALDIVES****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination anti-amarilic recommandée : non

**MALI****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination anti-amarilic recommandée : oui, à tous les voyageurs de plus de 9 mois se rendant dans le sud du Sahara.

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans

tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

**MALTE****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus de 9 mois en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune. Les enfants âgés de moins de 9 mois en provenance de zones où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune peuvent être isolés ou placés sous surveillance si cela se justifie du point de vue épidémiologique.

Vaccination anti-amarilic recommandée : non

**MARIANNES DU NORD, ÎLES****Fièvre jaune**

Condition exigée : non

Vaccination anti-amarilic recommandée : non

**MAROC****Fièvre jaune**

Condition exigée : non

Vaccination anti-amarilic recommandée : non

**MARSHALL, ÎLES****Fièvre jaune**

Condition exigée : non

Vaccination anti-amarilic recommandée : non

**MARTINIQUE****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination anti-amarilic recommandée : non

**MAURICE****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination anti-amarilic recommandée : non

**MAURITANIE****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui, à tous les voyageurs de plus de 9 mois se rendant dans le sud du Sahara.

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays, à l'exception des régions septentrionales (Dakhlet-Nouadhibou et Tiris-Zemour). À Adrar et Inchiri, il y a un risque de paludisme pendant la saison des pluies (de juillet à fin octobre). Résistance à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

**MAYOTTE (COLLECTIVITÉ TERRITORIALE FRANÇAISE)****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

**MEXIQUE****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû presque exclusivement à *P. vivax* – existe toute l'année dans certaines zones rurales peu visitées par les touristes. Le risque est modéré dans certaines localités des États de Chiapas et d'Oaxaca; on trouve également des localités à très faible risque dans les États de Chihuahua, Durango, Nayarit, Quintana Roo et Sinaloa.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II**

**MICRONÉSIE (ÉTATS FÉDÉRÉS DE)****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**MONACO****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**MONGOLIE****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**MONTÉNÉGRO****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**MONTSERRAT****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**MOZAMBIQUE****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

**MYANMAR (anciennement BIRMANIE)****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune. Les nationaux et résidents du Myanmar quittant ce pays pour une zone où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune doivent détenir un certificat de vaccination.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme :** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année au-dessous de 1000 m, sauf dans les principales zones urbaines de Mandalay et Yangon. Le risque est le plus grand dans les zones rurales reculées des régions de collines boisées. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée. Résistance à la méfloquine signalée dans l'État de Kayin et dans la partie orientale de l'État de Shan. Baisse de la sensibilité de *P. vivax* à la chloroquine signalée. Infection humaine à *P. knowlesi* signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **IV**

## NAMIBIE

### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune. Les pays ou parties de pays compris dans les zones d'endémie d'Afrique et d'Amérique du Sud sont considérés comme présentant un risque de transmission de la fièvre jaune. Le certificat n'est pas exigé des passagers des lignes aériennes régulières qui ont commencé leur voyage en dehors des pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune mais qui sont passés en transit par ces pays, à condition qu'ils n'aient pas quitté l'aéroport d'escale ou la ville attenante. Tous les passagers qui ont commencé leur voyage dans un pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune ou qui sont passés en transit par un pays dans ce cas doivent être munis d'un certificat lorsqu'ils ne voyagent pas à bord d'un avion de ligne régulière. Le certificat n'est pas exigé des enfants âgés de moins d'un an, mais ils pourront être soumis à une surveillance.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme :** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe de novembre à juin dans les régions suivantes : Ohangwena, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto et Otjozondjupa. Le risque est présent toute l'année le long du fleuve Kunene et dans les régions de Caprivi et de Kavango. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **IV**

## NAURU

### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

## NÉPAL

### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme :** le risque de paludisme – dû principalement à *P. vivax* – existe toute l'année dans les zones rurales des 20 districts du Terai situés le long de la frontière avec l'Inde, avec des flambées occasionnelles de paludisme à *P. falciparum* de juillet à octobre. La transmission saisonnière de *P. vivax* a lieu dans 45 districts de l'intérieur du Terai et de la zone de collines. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **III**

## NICARAGUA

### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme :** un risque faible de paludisme – dû principalement à *P. vivax* (92%) – existe toute l'année dans un certain nombre de municipalités de Chinandega, León, Managua, Matagalpa et des régions autonomes d'Atlántico Norte et Atlántico Sur. Des cas sont signalés dans d'autres municipalités des départements du centre et de l'ouest, mais le risque y est considéré comme très faible ou négligeable. On ne signale pas de résistance de *P. falciparum* à la chloroquine.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **II**

**NIGER****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an et recommandé aux voyageurs quittant le Niger.

Vaccination antiamarile recommandée: oui, à tous les voyageurs âgés de plus de 9 mois se rendant dans le sud du Sahara.

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

**NIGÉRIA****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

**NIOUÉ****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**NORFOLK, ÎLE VOIR AUSTRALIE****NORVÈGE****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**NOUVELLE-CALÉDONIE ET DÉPENDANCES****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés

de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

*Note.* En cas d'épidémie menaçant le territoire, un certificat de vaccination spécifique pourra être exigé.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**NOUVELLE-ZÉLANDE****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**OMAN****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** la transmission sporadique de *P. falciparum* et de *P. vivax* a été signalée jusqu'en 2003, puis de nouveau en 2007 et en 2008 (4 et 8 cas de paludisme à *P. vivax* seulement) suite à l'importation internationale du parasite.

Prévention recommandée: **aucune**

**OUGANDA****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays, y compris dans les villes principales de Fort Portal, Jinja, Kampala, Kigezi et Mbale. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

**OUZBÉKISTAN****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** des cas sporadiques de paludisme autochtone à *P. vivax* sont signalés à certains

endroits dans les parties méridionale et orientale du pays.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **I**

#### PAKISTAN

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de toute partie d'un pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune, à l'exception des enfants âgés de moins de 6 mois lorsque le certificat de vaccination de leur mère indique qu'elle a été vaccinée avant leur naissance.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – à *P. vivax* et à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays au-dessous de 2000 m. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

#### PALAO

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### PANAMA

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui, à tous les voyageurs âgés de plus de 9 mois qui se rendent dans les provinces de Comarca Emberá, Darién, Kuna Yala (anciennement San Blas) et Panama à l'est de la zone du canal de Panama, à l'exception de la zone du canal, de la ville de Panama et des îles San Blas.

**Paludisme:** un risque de paludisme – dû principalement à *P. vivax* (99%) – existe toute l'année dans les provinces situées le long de la côte atlantique et de la frontière avec la Colombie et le Costa Rica: Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Darién, Ngobe Bugle, Panama et Veraguas. Dans la ville de Panama, dans la zone du canal et dans

les autres provinces, le risque de transmission est nul ou négligeable. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine signalée dans les provinces de Darién et de San Blas.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II**; dans les zones d'endémie de l'est: **IV**

#### PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays au-dessous de 1800 m. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée. Résistance de *P. vivax* à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

#### PARAGUAY

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui, à tous les voyageurs âgés de plus de 9 mois.

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû presque exclusivement à *P. vivax* – est modéré dans certaines municipalités des départements d'Alto Paraná, Caaguazú et Canendeyú. Dans les autres départements, le risque de transmission est nul ou négligeable.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II**

#### PAYS-BAS

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### PÉROU

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: oui, à ceux qui ont l'intention de se rendre dans la jungle à une altitude inférieure à 2300 m. Les voyageurs qui se rendent uniquement dans les villes de Cuzco et Machu Picchu n'ont pas besoin d'être vaccinés.

**Paludisme:** le risque de paludisme – à *P. vivax* (85%) et à *P. falciparum* (15%) – existe toute l'année dans les zones rurales situées au-dessous de 2000 m. Les 23 districts les plus exposés sont concentrés dans les départements d'Ayacucho, Junín, Loreto, Madre de Dios et San Martín. Quarante-vingt dix-huit pour cent des cas à *P. falciparum* sont enregistrés à Loreto, département situé en Amazonie qui abrite 18 des districts du pays où le risque est le plus grand. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risques: **II** dans les zones à *P. vivax*; **IV** dans le département de Loreto.

#### PHILIPPINES

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme existe toute l'année dans les zones au-dessous de 600 m, sauf dans les 22 provinces d'Aklan, Albay, Benguet, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Guimaras, Iloilo, Leyte nord, Leyte sud, Marinduque, Masbate, Samar est, Samar nord, Samar ouest, Siquijor, Sorsogon, Surigao del Norte, et à Manille. On estime qu'il n'y a aucun risque dans les zones urbaines et les plaines. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée. Infection humaine à *P. knowlesi* signalée dans la province de Palawan.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

#### PITCAIRN, ÎLE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### POLOGNE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### POLYNÉSIE FRANÇAISE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### PORTO RICO

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### PORTUGAL

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### QATAR

##### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

#### RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** un risque très limité de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – peut exister de mai à fin octobre dans des foyers situés le long de la frontière septentrionale, en particulier dans les zones rurales du gouvernorat d'El Hasaka (aucun cas autochtone signalé depuis 2005).

Prévention recommandée: **aucune**

#### RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

##### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée : oui

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

#### RÉPUBLIQUE DE CORÉE

##### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : un risque limité de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – existe surtout dans les zones septentrionales des provinces de Gangwon Do et de Kyunggi Do et à Incheon (vers la zone démilitarisée).

Prévention recommandée dans les zones à risque : **I**

#### RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (anciennement ZAÏRE)

##### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an .

Vaccination antiamarile recommandée : oui

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

#### RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

##### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays, sauf à Vientiane. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **IV**

#### RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

##### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

#### RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

##### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû exclusivement à *P. falciparum* – existe toute l'année, en particulier dans les provinces occidentales de Dajabón, Elias Pina et San Juan. Le risque dans les autres régions est faible à négligeable. Il n'y a aucune preuve de résistance de *P. falciparum* à un antipaludique quelconque.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **II**

#### RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

##### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : un risque limité de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – existe dans certaines régions méridionales.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **I**

#### RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

##### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

#### RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

##### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : oui

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans

tout le pays au-dessous de 1800 m. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

### RÉUNION

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

### ROUMANIE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### ROYAUME-UNI (AVEC LES ÎLES ANGLO-NORMANDES ET L'ÎLE DE MAN)

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### RWANDA

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

### SAINTE-HÉLÈNE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

### SAINTE-LUCIE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

### SAINT-KITTS-ET-NEVIS

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

### SAINT-MARIN

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

### SALOMON, ÎLES

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année, sauf dans quelques îlots périphériques à l'est et au sud. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

### SAMOA

#### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

### SAMOA AMÉRICAINES

#### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

### SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

#### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée : oui

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

### SÉNÉGAL

#### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : oui

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays ; le risque est moindre de janvier à fin juin dans les régions du centre-ouest. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

### SERBIE

#### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

### SEYCHELLES

#### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

### SIERRA LEONE

#### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs.

Vaccination antiamarile recommandée : oui

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

### SINGAPOUR

#### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an qui, au cours des 6 jours précédents, ont séjourné dans des pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune ou sont passés par ces pays.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : un cas d'infection humaine à *P. knowlesi* signalé.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **I**

### SLOVAQUIE

#### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

### SLOVÉNIE

#### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

### SOMALIE

#### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en

provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Il est relativement faible et saisonnier dans le nord et plus important dans les parties centrale et méridionale du pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

### SOUDAN

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus de 9 mois en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune. Un certificat peut être exigé des voyageurs quittant le Soudan.

Vaccination antiamarile recommandée: oui, à tous les voyageurs âgés de plus de 9 mois se rendant dans le sud du Sahara, sauf dans la ville de Khartoum.

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Le risque est faible et saisonnier dans le nord. Il est plus grand dans le centre et le sud du pays. Il est très limité sur la côte de la mer Rouge. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

### SRI LANKA

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** il existe un risque relativement faible de paludisme – à *P. vivax* (88 %) et à *P. falciparum* (12 %) – toute l'année dans tout le pays, sauf dans les districts de Colombo, Galle, Gampaha, Kalutara, Matara et Nuwara Eliya. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **III**

### SUÈDE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### SUISSE

#### Fièvre jaune

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

### SURINAME

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – à *P. falciparum* (55 %), à *P. vivax* (43 %) et infections mixtes (2 %) – a diminué ces dernières années. Il existe toute l'année dans l'intérieur du pays, au-delà de la région côtière de savane et il atteint un maximum surtout le long de la frontière orientale et dans les régions d'extraction de l'or. Dans la ville de Paramaribo et dans les sept autres districts côtiers, le risque de transmission est faible ou négligeable. On signale une résistance de *P. falciparum* à la chloroquine, à la méfloquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine ainsi qu'une baisse de la sensibilité à la quinine.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

### SWAZILAND

#### Fièvre jaune

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tous les velds de basse altitude (essentiellement Big Bend, Mhlume, Simunye et Tshaneni). Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **IV**

**TADJIKISTAN****Fièvre jaune**

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. vivax* – existe de juin à fin octobre, en particulier dans les zones frontières méridionales (région de Khatlon) et dans quelques zones centrales (Douchanbé), occidentales (Gorno-Badakhshan) et septentrionales (région de Leninabad). Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée dans le sud du pays.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **III**

**TANZANIE, RÉPUBLIQUE-UNIE DE, voir  
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE****TCHAD****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : oui, à tous les voyageurs âgés de plus de 9 mois se rendant dans le sud du Sahara.

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

**THAÏLANDE****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus de 9 mois en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : le risque de paludisme existe toute l'année dans les zones rurales, particulièrement en forêt et en montagne, dans tout le pays, surtout à proximité des frontières internationales, y compris dans les provinces les plus méridionales. Il n'y a pas de risque dans les villes (comme Bangkok, Chiangmai et Pattaya), sur l'île de Samui et dans

les principales stations touristiques de l'île de Phuket. Il y a toutefois un risque dans d'autres zones et îles. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée. Résistance à la méfloquine et à la quinine signalée dans les zones bordant le Cambodge et le Myanmar. Infection humaine à *P. knowlesi* signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **I** ; dans les zones proches des frontières avec le Cambodge et le Myanmar : **IV**

**TIMOR-LESTE****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année sur tout le territoire. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

**TOGO****Fièvre jaune**

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé de tous les voyageurs âgés de plus d'1 an.

Vaccination antiamarile recommandée : oui

**Paludisme** : le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

**TOKÉLAOU**

(Territoire non autonome de la Nouvelle-Zélande)

Mêmes exigences que pour la Nouvelle-Zélande.

**TONGA****Fièvre jaune**

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

**TRINITÉ-ET-TOBAGO****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: oui, à tous les voyageurs âgés de plus de 9 mois dont l'itinéraire comprend la Trinité. La vaccination n'est pas recommandée à ceux qui ne se rendent qu'à Tobago.

**TUNISIE****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**TURQUIE****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – existe de mai à octobre dans la partie sud-est du pays. Il n'y a aucun risque de paludisme dans les principales zones touristiques de l'ouest et du sud-ouest du pays.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II**

**TURKMÉNISTAN****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû exclusivement à *P. vivax* – existe de juin à octobre dans certains villages du sud-est du pays à la frontière avec l'Afghanistan. Aucun cas autochtone signalé depuis 2006.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **I**

**TUVALU****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**UKRAINE****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**URUGUAY****Fièvre jaune**

Condition exigée: un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée: non

**VANUATU****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: non

**Paludisme:** un risque faible à modéré de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays. Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée. Résistance de *P. vivax* à la chloroquine signalée.

Prévention recommandée: **IV**

**VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)****Fièvre jaune**

Condition exigée: non

Vaccination antiamarile recommandée: oui

**Paludisme:** le risque de paludisme – dû à *P. vivax* (83 %) et à *P. falciparum* (16 %) – est modéré à élevé toute l'année dans certaines zones rurales des États d'Amazonas, Anzoátegui, Bolívar et Delta Amacuro. Le risque est faible dans les États d'Apure, Monagas, Sucre et Zulia. Le risque de paludisme à *P. falciparum* se limite essentiellement à des municipalités situées dans des zones de jungle des États d'Amazonas (Alto Orinoco, Atabapo, Atures, Autana, Manapiare, Rio Negro) et de Bolívar (Caroni, Cedeño, El Callao, Heres, Gran Sabana, Piar, Raúl Leoni, Rocio, Sifontes et Sucre). Résistance de *P. falciparum* à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque: **II** dans les zones à *P. vivax*; **IV** dans les zones à *P. falciparum*.

## VIET NAM

### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme :** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe dans tout le pays, sauf les centres urbains, le delta du fleuve Rouge, le delta du Mékong et les plaines côtières du centre du pays. Les zones à haut risque sont les hauts plateaux au-dessous de 1500 m au sud du 18° degré de latitude Nord, et notamment les quatre provinces principales de ces hauts plateaux, Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai et Kon Tum, ainsi que la province de Binh Phuoc et les parties occidentales des provinces côtières de Khanh Hoa, Ninh Thuan, Quang Nam et Quang Tri. Résistance à la chloroquine, à la sulfadoxine-pyriméthamine et à la méfloquine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **IV**

## VIERGES, ÎLES AMÉRICAINES

### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

## VIERGES, ÎLES BRITANNIQUES

### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

## WAKE, ÎLE

(Territoire des États-Unis d'Amérique)

### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

## YÉMEN

### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés

de plus d'1 an en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme :** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année, mais surtout de septembre à fin février, dans tout le pays au-dessous de 2000 m. Il n'y a aucun risque dans la ville de Sanaa. Le risque de paludisme est très limité sur l'île de Socotra. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **IV** ; sur l'île de Socotra : **I**

## ZAÏRE voir RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

## ZAMBIE

### Fièvre jaune

Condition exigée : non

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme :** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe toute l'année dans tout le pays, y compris à Lusaka. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée : **IV**

## ZIMBABWE

### Fièvre jaune

Condition exigée : un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

Vaccination antiamarile recommandée : non

**Paludisme :** le risque de paludisme – dû principalement à *P. falciparum* – existe de novembre à fin juin dans les zones au-dessous de 1200 m et toute l'année dans la vallée du Zambèze. À Bulawayo et Harare, le risque est négligeable. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.

Prévention recommandée dans les zones à risque : **IV**