



World Health
Organization

Aide-mémoire sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant

Santé de la mère

- Une femme meurt chaque minute de complications liées à la grossesse, soit plus de 500 000 femmes par an dans le monde.¹
- 99 % des décès maternels surviennent dans les pays en développement ; la plupart d'entre eux auraient pu être évités.²
- Le risque de mourir de complications liées à la maternité est de 1 sur 16 dans les pays en développement, contre 1 sur 2 800 dans les pays développés.⁵
- Chaque année, plus de 50 millions de femmes accouchent à domicile, sans l'aide d'un professionnel qualifié.¹
- Pour chaque femme décédant au cours de l'accouchement, 30 autres souffrent de traumatismes, d'infections ou de maladies.²

Santé du nouveau-né

- Sur les 130 millions d'enfants qui naissent chaque année dans le monde, quatre millions meurent avant l'âge de 28 jours.³
- On compte également quatre millions d'enfants mort-nés.³
- On aurait pu éviter 70 % des décès de nouveau-nés avec des solutions abordables, à l'efficacité prouvée, coûtant moins de \$1,00 chacune :⁴
 - Vaccination antitétanique de la mère pendant la grossesse
 - Trousses d'accouchement et examens de contrôle post-natals
 - Allaitement maternel immédiat et exclusif ; le fait de sécher et de réchauffer le nouveau-né.
- Pratiquement tous les financements et les travaux de recherche portent sur des solutions de haute technologie pour les 1 % de décès survenant dans les pays riches.³

Santé de l'enfant

- Chaque année, 10,6 millions d'enfants meurent avant l'âge de 5 ans.⁵
- Le risque de décès pour un jeune enfant est en moyenne 12 fois plus élevé dans les pays en développement que dans les pays à revenu élevé.⁷
- Chaque année, le nombre total d'enfants qui meurent (10,6 millions)⁸ dépasse le total cumulé des décès imputables au SIDA, au paludisme et à la tuberculose (5,8 millions).⁹
- Prés de deux décès d'enfants sur trois sont dus à des maladies courantes, que l'on peut prévenir ou traiter facilement ::
 - Diarrhée
 - Rougeole
 - Pneumonie
 - Tétanos
 - Paludisme
 - Malnutrison

Ressources nécessaires

- Il faut en moyenne US \$9 milliards par an pendant les dix prochaines années pour atteindre les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire.⁵
- La délivrance des soins maternels de base revient à environ US \$3 par personne dans les pays à faible revenu.²
- Un ensemble d'une vingtaine d'interventions abordables, parmi lesquelles l'allaitement, les vaccins, les antibiotiques et les vitamines, pourrait sauver 6 millions d'enfants par an pour un coût de \$25 seulement par enfant.¹⁰

Liens entre la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant

- Le concept de la « continuité des soins » est essentiel pour vaincre la mortalité de la mère, du nouveau-né et de l'enfant.^{3,5}
 - Cette continuité s'inscrit dans une première dimension, **le temps** : avant, pendant la grossesse, l'accouchement, les premiers jours de la vie, puis les premières années.
 - La seconde dimension est **le lieu**, en associant les divers niveaux de soins : à domicile, dans la communauté et dans les établissements de santé.
- Des interventions spécifiques, exécutées à des moments donnés, ont de multiples avantages.
- En associant les interventions, on peut réduire les coûts en améliorant l'efficacité.
- L'intégration des services favorise leur utilisation. Par exemple, le conseil pour l'allaitement immédiatement après l'accouchement donne l'occasion de promouvoir les soins post-partum, postnatals et les soins du nouveau-né.

Figure 1. Place: Connecting care across the Continuum of place



Figure 1. Time: Connecting care across the Continuum of time



Références:

- ¹ Activités du Fonds des Nations Unies pour la Population. *Etat de la population mondiale 2000 : Vivre ensemble dans des mondes séparés. Hommes et femmes à une époque de changements*. New York, N. Y., Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), 2000 (http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/468_filename_swp2000.pdf).
- ² The Inter-Agency Group for Safe Motherhood: www.safemotherhood.org.
- ³ Lawn JE, Cousens S, Zupan J. 4 million neonatal deaths: When? Where? Why? *Lancet* 2005; **365**: 891-900.
- ⁴ OMS. *Rapport sur la santé dans le monde 2005 - donnons sa chance à chaque mère et à chaque enfant*. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005. (<http://www.who.int/whr/2005/fr/index.html>).
- ⁵ Martines J, Paul VK, Bhutta ZA *et al.* Neonatal survival: a call for action. *Lancet* 2005; **365**: 1189-97.
- ⁶ ⁴ UNICEF. *The State of the World's Children 2006*. New York: UNICEF, 2005. <http://www.unicef.org/>.
- ⁷ U. S. Fund pour l'UNICEF, US Coalition for Child Survival Fact Sheet. www.childsurvival.org/factsheet.html.
- ⁸ Inter-Agency Group for Safe Motherhood. *The Safe Motherhood Action Agenda: Priorities for the Next Decade; Report on the Safe Motherhood Technical Consultation, 18-23 October 1997*. Colombo, Sri Lanka, et New York: Family Care International, 1997. http://www.safemotherhood.org/resources/pdf/e_action_agenda.PDF.
- ⁹ OMS/ODM: *La santé et les objectifs du Millénaire pour le développement*. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005 (http://www.who.int/mdg/publications/Report_du_omd.pdf).
- ¹⁰ Lawn, J. "for the Price Tag for Newborn and Child Survival." Presentation at Child Survival Countdown to 2015, Décembre 2005. <http://cs.server2.textor.com/programme.html>