

Tableau 14 de l'annexe Charge majeure de morbidité – facteurs de risque et maladies/traumatismes occupant les 10 premiers rangs, pays en développement à forte mortalité, 2000

Pays en développement où la mortalité est forte chez l'enfant et forte ou très forte chez l'adulte (Afr-D, Afr-E, Amr-D, MedO-D, Ase-D)

Facteurs de risque	% des AVCI	Maladies/traumatismes	% des AVCI
Insuffisance pondérale	14,9	VII/SIDA	9,0
Pratiques sexuelles à risque	10,2	Infections des voies respiratoires inférieures	8,2
Eau non potable et défaut d'assainissement et d'hygiène	5,5	Maladies diarrhéiques	6,3
Fumée de combustibles solides à l'intérieur des habitations	3,7	Maladies de l'enfant	5,5
Carence en zinc	3,2	Faible poids de naissance	5,0
Carence en fer ^a	3,1	Paludisme	4,9
Carence en vitamine A	3,0	Dépression unipolaire majeure	3,1
Hypertension	2,5	Cardiopathie ischémique	3,0
Tabagisme	2,0	Tuberculose	2,9
Hypercholestérolémie	1,9	Accidents de la circulation	2,0

^a La charge morbide résultant de la carence en fer est due aux causes maternelles et périnatales ainsi qu'aux effets directs de l'anémie.

Tableau 15 de l'annexe Charge majeure de morbidité – facteurs de risque et maladies/traumatismes occupant les 10 premiers rangs, pays en développement à faible mortalité, 2000

Pays en développement où la mortalité est faible chez l'enfant et faible chez l'adulte (Amr-B, Ase-B, MedO-B, PacO-B)

Facteurs de risque	% des AVCI	Maladies/traumatismes	% des AVCI
Alcool	6,2	Dépression unipolaire majeure	5,9
Hypertension	5,0	Maladie cérébrovasculaire	4,7
Tabagisme	4,0	Infections des voies respiratoires inférieures	4,1
Insuffisance pondérale	3,1	Accidents de la circulation	4,1
Surcharge pondérale	2,7	Bronchopneumopathie obstructive chronique	3,8
Hypercholestérolémie	2,1	Cardiopathie ischémique	3,2
Apport insuffisant en fruits et légumes	1,9	Asphyxie/traumatisme à la naissance	2,6
Fumée de combustibles solides à l'intérieur des habitations	1,9	Tuberculose	2,4
Carence en fer	1,8	Troubles liés à la consommation d'alcool	2,3
Eau non potable et défaut d'assainissement et d'hygiène ^a	1,7	Surdit�	2,2

^a La charge morbide résultant de l'usage d'eau non potable et du défaut d'assainissement et d'hygiène est due aux maladies diarrhéiques.

Tableau 16 de l'annexe Charge majeure de morbidité – facteurs de risque et maladies/traumatismes occupant les 10 premiers rangs, pays développés, 2000

Pays développés à mortalité très faible ou faible chez l'enfant (Amr-A, Eur-A, Eur-B, Eur-C, PacO-A)

Facteurs de risque	% des AVCI	Maladies/traumatismes	% des AVCI
Tabagisme	12,2	Cardiopathie ischémique	9,4
Hypertension	10,9	Dépression unipolaire majeure	7,2
Alcool	9,2	Maladie cérébrovasculaire	6,0
Hypercholestérolémie	7,6	Troubles liés à la consommation d'alcool	3,5
Surcharge pondérale	7,4	Démence et autres troubles du système nerveux central	3,0
Apport insuffisant en fruits et légumes	3,9	Surdit�	2,8
Sédentarité	3,3	Bronchopneumopathie obstructive chronique	2,6
Usage de drogues illicites	1,8	Accidents de la circulation	2,5
Pratiques sexuelles à risque ^a	0,8	Arthrose	2,5
Carence en fer ^b	0,7	Cancers de la trachée/des bronches/du poumon	2,4

^a La charge morbide résultant des pratiques sexuelles à risque est due au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles.

^b La charge morbide résultant de la carence en fer est due aux causes maternelles et périnatales ainsi qu'aux effets directs de l'anémie.

La fraction préventive correspondant à l'effet de la consommation d'alcool sur les maladies cardio-vasculaires observé dans certaines Régions n'est pas indiquée dans ces tableaux.

NB. Les facteurs de risque considérés ici sont également à l'origine d'autres maladies que celles indiquées dans ces tableaux; d'autres facteurs de risque ont en outre un rôle important dans l'étiologie des maladies considérées ici.

