

Tableau 6 de l'annexe Prévalence résumée de certains facteurs de risque par sous-région,<sup>a</sup> 2000<sup>b,c</sup>

| Facteur de risque <sup>d</sup>                                     | Critères retenus pour mesurer la prévalence                                                              | Afr-D | Afr-E | Amr-A | Amr-B | Amr-D | Ase-B | Ase-D | Eur-A | Eur-B | Eur-C | MedO-B | MedO-D | PacO-A | PacO-B |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Alcool</b>                                                      | Pourcentage de consommateurs d'alcool                                                                    | 38%   | 44%   | 67%   | 66%   | 62%   | 21%   | 14%   | 87%   | 62%   | 86%   | 10%    | 5%     | 84%    | 57%    |
| <b>Apport insuffisant en fruits et légumes</b>                     | Apport moyen par jour (g)                                                                                | 350   | 240   | 290   | 190   | 340   | 220   | 240   | 450   | 380   | 220   | 350    | 360    | 410    | 330    |
| <b>Carence en fer</b>                                              | Taux d'hémoglobine moyen (g/dl)                                                                          | 10,6  | 10,6  | 12,5  | 11,2  | 11,2  | 11,0  | 10,4  | 12,5  | 11,9  | 11,9  | 10,5   | 10,5   | 12,5   | 11,0   |
| <b>Carence en vitamine A</b>                                       | Pourcentage de sujets atteints de carence en vitamine A accompagnée d'héméralopie                        | 19%   | 23%   | 0%    | 9%    | 9%    | 28%   | 18%   | 0%    | 0%    | 0%    | 1%     | 16%    | 0%     | 9%     |
| <b>Carence en zinc</b>                                             | Pourcentage de sujets ayant un apport alimentaire inférieur à celui recommandé aux Etats-Unis d'Amérique | 37%   | 62%   | 6%    | 26%   | 68%   | 34%   | 73%   | 4%    | 13%   | 6%    | 25%    | 52%    | 4%     | 9%     |
| <b>Fumée de combustibles solides à l'intérieur des habitations</b> | Pourcentage d'utilisation des biocombustibles                                                            | 73%   | 86%   | 1%    | 25%   | 53%   | 66%   | 83%   | 0%    | 26%   | 7%    | 6%     | 55%    | 0%     | 28%    |
| <b>Grossesses non planifiées</b>                                   | Pourcentage de femmes n'utilisant pas de contraception moderne                                           | 91%   | 86%   | 33%   | 45%   | 68%   | 45%   | 65%   | 31%   | 66%   | 52%   | 63%    | 82%    | 46%    | 73%    |
| <b>Hypercholestérolémie</b>                                        | Cholestérolémie moyenne (mmo/l) <sup>e</sup>                                                             | 4,8   | 4,8   | 5,3   | 5,1   | 5,1   | 4,7   | 5,1   | 6,0   | 5,1   | 5,8   | 5,0    | 5,0    | 5,2    | 4,6    |
| <b>Hypertension</b>                                                | Tension systolique moyenne (mmHg)                                                                        | 133   | 129   | 127   | 128   | 128   | 128   | 125   | 135   | 137   | 138   | 133    | 131    | 133    | 124    |
| <b>Injections à risque dans le cadre des soins de santé</b>        | Pourcentage d'injections à risque entraînant une exposition à l'hépatite B chaque année                  | 5%    | 4%    | 0%    | 0%    | 0%    | 6%    | 10%   | 0%    | 0%    | 1%    | 0%     | 12%    | 0%     | 8%     |
| <b>Insuffisance pondérale</b>                                      | Pourcentage de sujets pour lesquels le rapport poids/âge est <2 écarts types                             | 32%   | 31%   | 2%    | 5%    | 12%   | 26%   | 46%   | 2%    | 8%    | 3%    | 8%     | 25%    | 4%     | 16%    |
| <b>Pollution de l'air urbain</b>                                   | Concentration des particules de taille inférieure à 10 microns (µg/m <sup>3</sup> )                      | 23    | 16    | 13    | 15    | 20    | 28    | 25    | 13    | 24    | 18    | 17     | 27     | 13     | 28     |
| <b>Sédentarité</b>                                                 | Pourcentage de sujets sédentaires                                                                        | 12%   | 11%   | 20%   | 23%   | 23%   | 15%   | 17%   | 17%   | 20%   | 24%   | 19%    | 18%    | 17%    | 16%    |
| <b>Séances sexuelles à enfant</b>                                  | Pourcentage d'adultes ayant un antécédent                                                                | 14%   | 33%   | 15%   | 9%    | 15%   | 6%    | 46%   | 9%    | 18%   | 16%   | 18%    | 18%    | 16%    | 26%    |
| <b>Surcharge pondérale</b>                                         | Indice de masse corporelle (kg/m <sup>2</sup> )                                                          | 21,3  | 21,8  | 26,9  | 26,0  | 26,0  | 23,1  | 19,9  | 26,7  | 26,5  | 26,5  | 25,2   | 22,3   | 23,4   | 22,9   |

<sup>a</sup> Voir la liste des Etats Membres par Région OMS et par strate de mortalité pour les précisions concernant les sous-régions.

<sup>b</sup> Les estimations sont standardisées sur l'âge, par rapport à la population de référence OMS la plus appropriée au facteur de risque : alcool, sévices sexuels à enfant et sédentarité : ≥15 ans ; hypertension, hypercholestérolémie, surcharge pondérale et apport insuffisant en fruits et légumes : ≥30 ans ; carence en fer, carence en vitamine A, carence en zinc et insuffisance pondérale : enfants de moins de 5 ans ; grossesses non planifiées : femmes de 15-44 ans.

<sup>c</sup> Ce tableau a été obtenu avec les dernières données disponibles et peut différer légèrement des informations données au chapitre 4.

<sup>d</sup> De nombreux facteurs de risque étaient caractérisés par plusieurs niveaux de risque ; ici, ces niveaux ont été regroupés en exposés et non exposés (ou une moyenne).

<sup>e</sup> 1 mmol/l = 38,7 mg/dl.