

Tableau 3 de l'annexe Nombre annuel de décès par cause chez les enfants de moins de cinq ans par Région de l'OMS, estimations pour 2000–2003^a

L'OMS a calculé ces chiffres de manière à les rendre comparables. Ils ne correspondent pas nécessairement aux statistiques officielles des Etats Membres, qui peuvent utiliser d'autres méthodes tout aussi rigoureuses.

Cause	ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES		AFRIQUE		AMERIQUES				ASIE DU SUD-EST		EUROPE			MEDITERRANEE ORIENTALE		PACIFIQUE OCCIDENTAL											
	Ensemble des Etats Membres	Etats Membres à faible mortalité (Canada et Etats-Unis)	Autres	Ensemble des Etats Membres	Etats Membres à faible mortalité (Canada et Etats-Unis)	Autres	Ensemble des Etats Membres	Etats Membres à faible mortalité ^b	Autres	Ensemble des Etats Membres	Etats Membres à faible mortalité (Australie, Japon et Nouvelle-Zélande)	Autres	Ensemble des Etats Membres	Etats Membres à faible mortalité (Australie, Japon et Nouvelle-Zélande)	Autres												
Population (000)	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total					
Nombre total de décès	10 596	100	4 396	100	439	100	50	100	389	100	3 070	100	263	100	25	100	238	100	1 409	100	1 020	100	7	100	1 013	100	
VIH/SIDA	321	3	285	6	6	1	0	0	6	2	22	1	1	0	0	0	1	0	4	0	3	0	0	0	3	0	
Maladies diarrhéiques ^c	1762	17	701	16	51	12	0	0	51	13	552	18	35	13	0	0	35	15	245	17	178	17	0	0	178	18	
Rougeole	395	4	227	5	1	0	0	0	1	0	103	3	2	1	0	0	1	1	52	4	11	1	0	0	11	1	
Paludisme	853	8	802	18	1	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	37	3	1	0	0	0	1	0	
Infections respiratoires aiguës	2 027	19	924	21	54	12	1	2	53	14	590	19	32	12	0	2	31	13	292	21	137	13	0	4	137	13	
Causes néonatales ^d	3 910	37	1 148	26	195	44	29	58	166	43	1 362	44	116	44	14	55	102	43	610	43	480	47	3	43	477	47	
Traumatismes	305	3	76	2	23	5	5	10	18	5	71	2	17	7	2	7	16	7	45	3	73	7	1	12	72	7	
<i>Non intentionnels</i>	291
Accidents de la route	50
Noyades	60
<i>Intentionnels</i>	14
Autres	1 022	10	233	5	109	25	15	30	94	24	359	12	61	23	9	36	52	22	124	9	137	13	3	40	134	13	

^a Les sources et les méthodes sont indiquées dans les notes explicatives.

^b Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Suède et Suisse.

^c Ne comporte que les décès survenus pendant la période postnéonatale.

^d Les causes néonatales incluent les diarrhées survenues pendant la période néonatale (voir Tableau 4 de l'annexe). Dans l'ensemble du monde, la proportion de l'ensemble des décès attribuables à la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans est égale à 18 %.

... Non disponible.

Tableau 4 de l'annexe Nombre annuel de décès par cause chez les nouveau-nés par Région de l'OMS, estimations pour 2000–2003^a

L'OMS a calculé ces chiffres de manière à les rendre comparables. Ils ne correspondent pas nécessairement aux statistiques officielles des Etats Membres, qui peuvent utiliser d'autres méthodes tout aussi rigoureuses.

Cause	ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES		AFRIQUE		AMERIQUES				ASIE DU SUD-EST		EUROPE			MEDITERRANEE ORIENTALE		PACIFIQUE OCCIDENTAL										
	Ensemble des Etats Membres	Etats Membres à faible mortalité (Canada et Etats-Unis)	Autres	Ensemble des Etats Membres	Etats Membres à faible mortalité (Canada et Etats-Unis)	Autres	Ensemble des Etats Membres	Etats Membres à faible mortalité ^b	Autres	Ensemble des Etats Membres	Etats Membres à faible mortalité (Australie, Japon et Nouvelle-Zélande)	Autres	Ensemble des Etats Membres	Etats Membres à faible mortalité (Australie, Japon et Nouvelle-Zélande)	Autres											
	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total				
Nombre total de décès néonataux	3 910	100	1 148	100	195	100	29	100	166	100	1 362	100	116	100	14	100	102	100	610	100	480	100	3	100	477	100
Tétanos néonatal	257	7	108	9	2	1	0	0	2	1	58	4	1	1	0	0	1	1	72	12	16	3	0	0	16	3
Infections graves ^c	1 016	26	313	27	34	17	2	6	32	19	374	27	21	18	1	6	20	20	174	28	101	21	0	6	101	21
Mort apparente du nouveau-né*	894	23	274	24	36	19	4	14	33	20	314	23	21	18	2	15	19	18	122	20	127	26	0	14	126	26
Maladies diarrhéiques	108	3	40	3	1	1	0	0	1	1	37	3	1	1	0	0	1	1	22	4	7	1	0	0	7	1
Anomalies congénitales	294	8	70	6	31	16	8	29	22	13	77	6	21	19	4	32	17	17	54	9	40	8	1	31	39	8
Prématurité ^d	1 083	28	265	23	78	40	13	45	65	39	413	30	44	38	6	41	38	37	132	22	152	32	1	44	151	32
Autres	258	7	78	7	13	7	2	7	11	7	89	7	7	6	1	6	6	6	35	6	36	8	0	7	36	8

^a Les sources et les méthodes sont indiquées dans les notes explicatives.

^b Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Suède et Suisse.

^c Comporte les décès par pneumonie, méningite, septicémie et autres infections survenues pendant la période néonatale.

^d Ne comporte que les décès directement attribués à la prématurité et à des complications particulières de la prématurité telles qu'un déficit en surfactant pulmonaire, mais pas l'ensemble des décès survenus chez les prématurés.

*Egalement appelée détresse respiratoire à la naissance.